

表 2996 クレアチニン濃度(mg/dL) 総コレステロール濃度(mg/dL)別(腹膜透析患者)

総コレステロール濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	1 (2.0)		4 (8.2)	7 (14.3)	13 (26.5)	7 (14.3)	9 (18.4)	5 (10.2)	3 (6.1)	49 (100.0)	1	50	10.49	3.62
100～ (%)	1 (0.6)	3 (1.9)	10 (6.4)	25 (15.9)	29 (18.5)	34 (21.7)	29 (18.5)	17 (10.8)	9 (5.7)	157 (100.0)	3	160	10.55	3.49
120～ (%)	3 (0.7)	12 (2.7)	34 (7.7)	69 (15.6)	81 (18.4)	71 (16.1)	83 (18.8)	51 (11.6)	37 (8.4)	441 (100.0)	7	448	10.63	3.86
140～ (%)	1 (0.1)	13 (1.6)	62 (7.9)	126 (16.0)	172 (21.8)	158 (20.0)	118 (15.0)	81 (10.3)	58 (7.4)	789 (100.0)	17	806	10.45	3.60
160～ (%)	2 (0.2)	15 (1.8)	74 (8.7)	146 (17.1)	181 (21.2)	179 (21.0)	120 (14.1)	89 (10.4)	46 (5.4)	852 (100.0)	13	865	10.23	3.57
180～ (%)		17 (2.1)	85 (10.3)	150 (18.2)	210 (25.5)	164 (19.9)	102 (12.4)	57 (6.9)	39 (4.7)	824 (100.0)	9	833	9.79	3.34
200～ (%)	4 (0.7)	8 (1.4)	55 (9.9)	105 (18.9)	132 (23.7)	104 (18.7)	89 (16.0)	41 (7.4)	18 (3.2)	556 (100.0)	8	564	9.79	3.31
220～ (%)	2 (0.6)	9 (2.8)	31 (9.8)	59 (18.7)	88 (27.8)	62 (19.6)	30 (9.5)	26 (8.2)	9 (2.8)	316 (100.0)	2	318	9.51	3.29
240～ (%)		9 (5.7)	21 (13.3)	31 (19.6)	40 (25.3)	28 (17.7)	16 (10.1)	10 (6.3)	3 (1.9)	158 (100.0)	1	159	8.96	3.26
260～ (%)		7 (4.8)	19 (13.0)	37 (25.3)	34 (23.3)	29 (19.9)	14 (9.6)	4 (2.7)	2 (1.4)	146 (100.0)	3	149	8.71	2.89
合計 (%)	14 (0.3)	93 (2.2)	395 (9.2)	755 (17.6)	980 (22.9)	836 (19.5)	610 (14.2)	381 (8.9)	224 (5.2)	4,288 (100.0)	64	4,352	10.04	3.51
記載なし (%)	3 (0.2)	61 (3.6)	180 (10.7)	378 (22.4)	369 (21.9)	279 (16.5)	238 (14.1)	107 (6.3)	71 (4.2)	1,686 (100.0)	2,903	4,589	9.51	3.56
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	171.36	189.17	186.01	183.40	182.68	179.32	172.71	170.33	165.21	179.13	170.84	179.01		
標準偏差	46.26	48.01	44.23	40.99	41.18	39.44	38.64	36.13	32.76	40.51	41.99	40.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査