

表 2997 クレアチニン濃度(mg/dL) HDL-C濃度(mg/dL)別(腹膜透析患者)

HDL-C濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			2 (25.0)	1 (12.5)	2 (25.0)		1 (12.5)		2 (25.0)	8 (100.0)		8	10.27	4.65
20～ (%)	2 (0.7)	3 (1.1)	18 (6.4)	31 (11.0)	48 (17.1)	50 (17.8)	56 (19.9)	47 (16.7)	26 (9.3)	281 (100.0)	7	288	11.36	3.78
30～ (%)	2 (0.2)	20 (2.2)	77 (8.5)	163 (18.0)	179 (19.7)	181 (20.0)	145 (16.0)	78 (8.6)	62 (6.8)	907 (100.0)	26	933	10.24	3.57
40～ (%)	3 (0.3)	22 (2.3)	86 (8.8)	187 (19.1)	221 (22.6)	181 (18.5)	131 (13.4)	91 (9.3)	55 (5.6)	977 (100.0)	13	990	10.03	3.57
50～ (%)	1 (0.1)	20 (2.4)	65 (7.9)	140 (17.0)	199 (24.2)	175 (21.3)	115 (14.0)	66 (8.0)	41 (5.0)	822 (100.0)	17	839	10.02	3.43
60～ (%)	3 (0.6)	9 (1.8)	47 (9.4)	87 (17.3)	121 (24.1)	101 (20.1)	74 (14.7)	43 (8.6)	17 (3.4)	502 (100.0)	14	516	9.94	3.34
70～ (%)	2 (0.8)	6 (2.3)	26 (10.1)	54 (20.9)	68 (26.4)	44 (17.1)	29 (11.2)	20 (7.8)	9 (3.5)	258 (100.0)	1	259	9.57	3.24
80～ (%)		4 (2.9)	9 (6.4)	34 (24.3)	35 (25.0)	26 (18.6)	19 (13.6)	8 (5.7)	5 (3.6)	140 (100.0)	1	141	9.67	3.35
90～ (%)		2 (3.3)	9 (15.0)	10 (16.7)	11 (18.3)	13 (21.7)	6 (10.0)	9 (15.0)		60 (100.0)	1	61	9.43	3.46
100～ (%)		1 (1.8)	6 (10.5)	12 (21.1)	16 (28.1)	13 (22.8)	5 (8.8)	4 (7.0)		57 (100.0)		57	9.11	2.83
合計 (%)	13 (0.3)	87 (2.2)	345 (8.6)	719 (17.9)	900 (22.4)	784 (19.5)	581 (14.5)	366 (9.1)	217 (5.4)	4,012 (100.0)	80	4,092	10.10	3.51
記載なし (%)	4 (0.2)	67 (3.4)	230 (11.7)	414 (21.1)	449 (22.9)	331 (16.9)	267 (13.6)	122 (6.2)	78 (4.0)	1,962 (100.0)	2,887	4,849	9.46	3.53
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	50.46	52.03	51.67	51.82	51.87	50.99	48.77	48.82	44.67	50.55	46.45	50.47		
標準偏差	17.64	16.76	18.21	18.46	17.30	18.03	17.65	17.89	14.34	17.77	14.72	17.72		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査