

表 2998 クレアチニン濃度(mg/dL) Non-HDL-C濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

Non-HDL-C濃度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)				4 (22.2)	3 (16.7)	6 (33.3)	3 (16.7)	1 (5.6)	1 (5.6)	18 (100.0)		18	10.57	3.08
50～ (%)		1 (0.9)	6 (5.4)	21 (18.8)	21 (18.8)	21 (18.8)	23 (20.5)	16 (14.3)	3 (2.7)	112 (100.0)	2	114	10.68	3.34
70～ (%)	2 (0.6)	5 (1.5)	25 (7.3)	56 (16.3)	86 (25.1)	60 (17.5)	52 (15.2)	29 (8.5)	28 (8.2)	343 (100.0)	8	351	10.42	3.56
90～ (%)	4 (0.6)	13 (2.0)	43 (6.6)	106 (16.3)	125 (19.2)	141 (21.6)	100 (15.3)	72 (11.0)	48 (7.4)	652 (100.0)	8	660	10.53	3.68
110～ (%)	1 (0.1)	16 (2.0)	69 (8.8)	134 (17.1)	172 (21.9)	167 (21.3)	108 (13.8)	72 (9.2)	45 (5.7)	784 (100.0)	13	797	10.14	3.49
130～ (%)	2 (0.3)	12 (1.8)	64 (9.9)	107 (16.5)	146 (22.5)	133 (20.5)	99 (15.3)	57 (8.8)	29 (4.5)	649 (100.0)	13	662	10.07	3.42
150～ (%)	1 (0.2)	5 (1.2)	52 (12.0)	77 (17.8)	112 (25.9)	73 (16.9)	59 (13.7)	29 (6.7)	24 (5.6)	432 (100.0)	4	436	9.85	3.53
170～ (%)	1 (0.4)	10 (3.8)	15 (5.7)	54 (20.6)	63 (24.0)	50 (19.1)	32 (12.2)	28 (10.7)	9 (3.4)	262 (100.0)	1	263	9.88	3.40
190～ (%)	1 (0.8)	5 (4.2)	12 (10.0)	25 (20.8)	33 (27.5)	18 (15.0)	18 (15.0)	5 (4.2)	3 (2.5)	120 (100.0)		120	9.14	3.22
210～ (%)		4 (4.6)	14 (16.1)	21 (24.1)	18 (20.7)	19 (21.8)	4 (4.6)	6 (6.9)	1 (1.1)	87 (100.0)	3	90	8.67	3.07
合計 (%)	12 (0.3)	71 (2.1)	300 (8.7)	605 (17.5)	779 (22.5)	688 (19.9)	498 (14.4)	315 (9.1)	191 (5.5)	3,459 (100.0)	52	3,511	10.12	3.51
記載なし (%)	5 (0.2)	83 (3.3)	275 (10.9)	528 (21.0)	570 (22.7)	427 (17.0)	350 (13.9)	173 (6.9)	104 (4.1)	2,515 (100.0)	2,915	5,430	9.56	3.53
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	123.08	139.59	135.55	130.79	130.95	127.01	124.92	123.52	119.83	128.53	124.69	128.47		
標準偏差	36.89	43.85	40.70	39.29	38.86	37.05	36.23	35.03	31.89	37.98	40.46	38.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査