

表 2999 クレアチニン濃度(mg/dL) 収縮期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

収縮期血圧	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)				1 (100.0)						1 (100.0)		1	7.70	
60～ (%)			4 (30.8)	3 (23.1)	6 (46.2)					13 (100.0)		13	7.16	1.68
80～ (%)		9 (7.8)	27 (23.3)	21 (18.1)	31 (26.7)	18 (15.5)	5 (4.3)	1 (0.9)	4 (3.4)	116 (100.0)	8	124	8.04	3.15
100～ (%)	1 (0.2)	27 (4.3)	90 (14.3)	133 (21.2)	150 (23.9)	96 (15.3)	73 (11.6)	36 (5.7)	22 (3.5)	628 (100.0)	13	641	9.13	3.41
120～ (%)	6 (0.4)	42 (2.8)	148 (10.0)	306 (20.7)	353 (23.9)	275 (18.6)	178 (12.0)	112 (7.6)	60 (4.1)	1,480 (100.0)	36	1,516	9.62	3.45
140～ (%)		20 (1.3)	106 (6.9)	265 (17.2)	348 (22.6)	335 (21.7)	232 (15.1)	148 (9.6)	87 (5.6)	1,541 (100.0)	38	1,579	10.36	3.38
160～ (%)	1 (0.1)	7 (1.0)	46 (6.5)	83 (11.7)	133 (18.8)	142 (20.1)	154 (21.8)	86 (12.1)	56 (7.9)	708 (100.0)	13	721	11.07	3.51
180～ (%)		4 (1.9)	15 (7.0)	27 (12.7)	29 (13.6)	40 (18.8)	56 (26.3)	25 (11.7)	17 (8.0)	213 (100.0)	4	217	11.17	3.66
200～ (%)			1 (3.2)	3 (9.7)	4 (12.9)	7 (22.6)	4 (12.9)	11 (35.5)	1 (3.2)	31 (100.0)		31	11.98	3.26
220～ (%)				2 (20.0)	3 (30.0)		4 (40.0)	1 (10.0)		10 (100.0)		10	11.02	3.13
合計 (%)	8 (0.2)	109 (2.3)	437 (9.2)	844 (17.8)	1,057 (22.3)	913 (19.3)	706 (14.9)	420 (8.9)	247 (5.2)	4,741 (100.0)	112	4,853	10.05	3.50
記載なし (%)	9 (0.7)	45 (3.6)	138 (11.2)	289 (23.4)	292 (23.7)	202 (16.4)	142 (11.5)	68 (5.5)	48 (3.9)	1,233 (100.0)	2,855	4,088	9.25	3.55
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	130.13	129.01	133.65	137.10	138.56	142.70	147.55	148.39	147.45	141.08	137.92	141.01		
標準偏差	17.02	23.05	24.11	21.73	22.30	21.38	22.82	22.98	21.84	22.89	22.19	22.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査