

表 3000 クレアチニン濃度(mg/dL) 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				1 (100.0)						1 (100.0)		1	6.80	
20～ (%)		1 (6.7)	4 (26.7)	4 (26.7)	3 (20.0)	2 (13.3)	1 (6.7)			15 (100.0)		15	7.57	2.73
40～ (%)	1 (0.3)	14 (3.9)	69 (19.3)	80 (22.3)	92 (25.7)	54 (15.1)	26 (7.3)	14 (3.9)	8 (2.2)	358 (100.0)	17	375	8.50	3.13
60～ (%)	6 (0.3)	61 (3.0)	210 (10.4)	426 (21.1)	476 (23.6)	391 (19.4)	242 (12.0)	139 (6.9)	65 (3.2)	2,016 (100.0)	49	2,065	9.48	3.31
80～ (%)		21 (1.7)	86 (6.8)	195 (15.4)	301 (23.8)	256 (20.2)	217 (17.1)	122 (9.6)	69 (5.4)	1,267 (100.0)	29	1,296	10.40	3.34
90～ (%)		7 (1.0)	44 (6.3)	100 (14.2)	126 (17.9)	137 (19.5)	137 (19.5)	92 (13.1)	59 (8.4)	702 (100.0)	12	714	11.08	3.61
100～ (%)	1 (0.3)	4 (1.2)	18 (5.3)	34 (9.9)	49 (14.3)	69 (20.2)	75 (21.9)	49 (14.3)	43 (12.6)	342 (100.0)	5	347	11.77	3.84
120～ (%)			2 (11.1)		4 (22.2)	2 (11.1)	6 (33.3)	3 (16.7)	1 (5.6)	18 (100.0)		18	11.56	3.35
140～ (%)									1 (100.0)	1 (100.0)		1	17.10	
合計 (%)	8 (0.2)	108 (2.3)	433 (9.2)	840 (17.8)	1,051 (22.3)	911 (19.3)	704 (14.9)	419 (8.9)	246 (5.2)	4,720 (100.0)	112	4,832	10.06	3.50
記載なし (%)	9 (0.7)	46 (3.7)	142 (11.3)	293 (23.4)	298 (23.8)	204 (16.3)	144 (11.5)	69 (5.5)	49 (3.9)	1,254 (100.0)	2,855	4,109	9.24	3.56
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	70.00	72.79	73.67	76.06	77.53	79.65	82.96	84.21	86.46	79.07	76.57	79.01		
標準偏差	16.38	14.13	15.40	13.44	13.66	13.93	13.70	14.20	14.78	14.43	14.36	14.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査