

表 3001 クレアチニン濃度(mg/dL) 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
40未満 (%)			2 (40.0)	1 (20.0)		1 (20.0)	1 (20.0)			5 (100.0)		5	8.32	3.76
40～ (%)			2 (8.3)	4 (16.7)	4 (16.7)	7 (29.2)	3 (12.5)	3 (12.5)	1 (4.2)	24 (100.0)	1	25	10.68	3.41
50～ (%)		1 (0.6)	20 (11.2)	26 (14.6)	42 (23.6)	29 (16.3)	21 (11.8)	23 (12.9)	16 (9.0)	178 (100.0)	9	187	10.51	3.76
60～ (%)		26 (3.1)	77 (9.3)	135 (16.3)	172 (20.8)	157 (19.0)	140 (16.9)	79 (9.6)	40 (4.8)	826 (100.0)	24	850	10.14	3.57
70～ (%)	2 (0.2)	24 (1.9)	96 (7.7)	223 (18.0)	278 (22.4)	243 (19.6)	198 (16.0)	107 (8.6)	70 (5.6)	1,241 (100.0)	30	1,271	10.19	3.47
80～ (%)	1 (0.1)	14 (1.4)	85 (8.5)	181 (18.1)	216 (21.6)	204 (20.4)	153 (15.3)	97 (9.7)	51 (5.1)	1,002 (100.0)	22	1,024	10.24	3.47
90～ (%)	1 (0.2)	11 (2.3)	59 (12.4)	83 (17.4)	109 (22.9)	91 (19.1)	56 (11.8)	39 (8.2)	27 (5.7)	476 (100.0)	5	481	9.82	3.57
100～ (%)	1 (0.5)	5 (2.6)	15 (7.7)	36 (18.6)	42 (21.6)	43 (22.2)	23 (11.9)	20 (10.3)	9 (4.6)	194 (100.0)	10	204	9.90	3.36
110～ (%)			4 (7.8)	12 (23.5)	15 (29.4)	7 (13.7)	5 (9.8)	5 (9.8)	3 (5.9)	51 (100.0)	1	52	9.92	3.43
120～ (%)		2 (11.1)	6 (33.3)	5 (27.8)	2 (11.1)	1 (5.6)	1 (5.6)		1 (5.6)	18 (100.0)	2	20	7.20	3.40
合計 (%)	5 (0.1)	83 (2.1)	366 (9.1)	706 (17.6)	880 (21.9)	783 (19.5)	601 (15.0)	373 (9.3)	218 (5.4)	4,015 (100.0)	104	4,119	10.13	3.51
記載なし (%)	12 (0.6)	71 (3.6)	209 (10.7)	427 (21.8)	469 (23.9)	332 (16.9)	247 (12.6)	115 (5.9)	77 (3.9)	1,959 (100.0)	2,863	4,822	9.38	3.50
総計 (%)	17 (0.3)	154 (2.6)	575 (9.6)	1,133 (19.0)	1,349 (22.6)	1,115 (18.7)	848 (14.2)	488 (8.2)	295 (4.9)	5,974 (100.0)	2,967	8,941	9.89	3.53
平均	85.60	77.93	78.47	78.92	78.46	77.98	76.99	77.49	77.90	78.11	77.39	78.09		
標準偏差	14.67	13.66	14.84	13.41	12.99	12.99	12.25	13.21	13.31	13.20	15.80	13.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査