

表 3002 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	79	117	596	3,672	15,118	32,924	30,623	13,975	4,454	1,980	103,538	8,977	112,515	1.40	0.26
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.6)	(3.5)	(14.6)	(31.8)	(29.6)	(13.5)	(4.3)	(1.9)	(100.0)				
女性	21	50	178	832	3,210	8,727	15,513	15,660	9,737	6,386	60,314	5,380	65,694	1.62	0.31
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.3)	(1.4)	(5.3)	(14.5)	(25.7)	(26.0)	(16.1)	(10.6)	(100.0)				
合計	100	167	774	4,504	18,328	41,651	46,136	29,635	14,191	8,366	163,852	14,357	178,209	1.48	0.30
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.5)	(2.7)	(11.2)	(25.4)	(28.2)	(18.1)	(8.7)	(5.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	100	167	774	4,504	18,328	41,651	46,136	29,635	14,191	8,366	163,852	14,357	178,209	1.48	0.30
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.5)	(2.7)	(11.2)	(25.4)	(28.2)	(18.1)	(8.7)	(5.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査