

表 3010 single pool Kt/V(Kt/Vsp) nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	67 (18.2)	14 (3.8)	25 (6.8)	47 (12.7)	77 (20.9)	53 (14.4)	52 (14.1)	23 (6.2)	6 (1.6)	5 (1.4)	369 (100.0)		369	1.01	0.49
0.4～ (%)	28 (0.3)	100 (1.2)	300 (3.6)	883 (10.5)	1,744 (20.7)	2,274 (27.0)	1,754 (20.8)	807 (9.6)	349 (4.1)	175 (2.1)	8,414 (100.0)	4	8,418	1.30	0.32
0.6～ (%)	5 (0.0)	47 (0.1)	347 (0.7)	2,242 (4.4)	8,052 (15.8)	14,956 (29.4)	13,608 (26.7)	7,330 (14.4)	2,961 (5.8)	1,389 (2.7)	50,937 (100.0)	19	50,956	1.41	0.28
0.8～ (%)		6 (0.0)	88 (0.1)	1,131 (1.6)	6,781 (9.6)	18,339 (26.0)	21,149 (30.0)	13,365 (19.0)	6,241 (8.9)	3,351 (4.8)	70,451 (100.0)	60	70,511	1.50	0.27
1.0～ (%)			11 (0.0)	177 (0.6)	1,511 (5.4)	5,367 (19.0)	8,244 (29.3)	6,686 (23.7)	3,667 (13.0)	2,516 (8.9)	28,179 (100.0)	69	28,248	1.59	0.29
1.2～ (%)			3 (0.1)	20 (0.4)	143 (2.9)	607 (12.4)	1,215 (24.9)	1,273 (26.1)	847 (17.4)	772 (15.8)	4,880 (100.0)	36	4,916	1.69	0.31
1.4～ (%)				2 (0.4)	18 (3.4)	51 (9.6)	102 (19.2)	130 (24.4)	103 (19.4)	126 (23.7)	532 (100.0)	23	555	1.77	0.35
1.6～ (%)				2 (2.9)	1 (1.4)	3 (4.3)	10 (14.5)	18 (26.1)	13 (18.8)	22 (31.9)	69 (100.0)	10	79	1.82	0.35
1.8～ (%)						1 (7.7)		2 (15.4)	3 (23.1)	7 (53.8)	13 (100.0)	12	25	2.28	0.58
2.0～ (%)					1 (12.5)		2 (25.0)	1 (12.5)	1 (12.5)	3 (37.5)	8 (100.0)	30	38	1.86	0.49
合計 (%)	100 (0.1)	167 (0.1)	774 (0.5)	4,504 (2.7)	18,328 (11.2)	41,651 (25.4)	46,136 (28.2)	29,635 (18.1)	14,191 (8.7)	8,366 (5.1)	163,852 (100.0)	263	164,115	1.48	0.30
記載なし (%)												14,094	14,094		
総計 (%)	100 (0.1)	167 (0.1)	774 (0.5)	4,504 (2.7)	18,328 (11.2)	41,651 (25.4)	46,136 (28.2)	29,635 (18.1)	14,191 (8.7)	8,366 (5.1)	163,852 (100.0)	14,357	178,209	1.48	0.30
平均	0.38	0.55	0.63	0.72	0.79	0.83	0.87	0.90	0.92	0.96	0.86	1.27	0.86		
標準偏差	0.10	0.12	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.19	0.17	0.50	0.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査