

表 3011 single pool Kt/V(Kt/Vsp) nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	53 (22.3)	9 (3.8)	19 (8.0)	28 (11.8)	51 (21.4)	35 (14.7)	26 (10.9)	15 (6.3)	1 (0.4)	1 (0.4)	238 (100.0)		238	0.94	0.48
0.4～ (%)	21 (0.4)	72 (1.3)	235 (4.3)	684 (12.5)	1,298 (23.8)	1,581 (29.0)	1,076 (19.7)	343 (6.3)	107 (2.0)	36 (0.7)	5,453 (100.0)	2	5,455	1.24	0.29
0.6～ (%)	5 (0.0)	32 (0.1)	271 (0.8)	1,840 (5.4)	6,596 (19.3)	11,673 (34.2)	8,907 (26.1)	3,527 (10.3)	936 (2.7)	336 (1.0)	34,123 (100.0)	10	34,133	1.35	0.24
0.8～ (%)		4 (0.0)	63 (0.1)	948 (2.1)	5,761 (12.8)	14,772 (32.9)	14,182 (31.6)	6,356 (14.1)	2,049 (4.6)	812 (1.8)	44,947 (100.0)	28	44,975	1.42	0.24
1.0～ (%)			6 (0.0)	155 (1.0)	1,276 (7.9)	4,336 (27.0)	5,547 (34.5)	3,101 (19.3)	1,068 (6.6)	579 (3.6)	16,068 (100.0)	34	16,102	1.49	0.25
1.2～ (%)			2 (0.1)	15 (0.6)	119 (4.9)	487 (20.2)	809 (33.6)	558 (23.1)	251 (10.4)	170 (7.1)	2,411 (100.0)	17	2,428	1.57	0.28
1.4～ (%)				1 (0.4)	16 (6.2)	37 (14.3)	67 (25.9)	65 (25.1)	36 (13.9)	37 (14.3)	259 (100.0)	13	272	1.65	0.33
1.6～ (%)				1 (3.4)	1 (3.4)	2 (6.9)	8 (27.6)	8 (27.6)	6 (20.7)	3 (10.3)	29 (100.0)	5	34	1.68	0.33
1.8～ (%)						1 (16.7)		1 (16.7)		4 (66.7)	6 (100.0)	8	14	2.37	0.69
2.0～ (%)							1 (25.0)	1 (25.0)		2 (50.0)	4 (100.0)	24	28	1.93	0.43
合計 (%)	79 (0.1)	117 (0.1)	596 (0.6)	3,672 (3.5)	15,118 (14.6)	32,924 (31.8)	30,623 (29.6)	13,975 (13.5)	4,454 (4.3)	1,980 (1.9)	103,538 (100.0)	141	103,679	1.40	0.26
記載なし (%)												8,836	8,836		
総計 (%)	79 (0.1)	117 (0.1)	596 (0.6)	3,672 (3.5)	15,118 (14.6)	32,924 (31.8)	30,623 (29.6)	13,975 (13.5)	4,454 (4.3)	1,980 (1.9)	103,538 (100.0)	8,977	112,515	1.40	0.26
平均	0.38	0.54	0.63	0.73	0.79	0.84	0.87	0.90	0.92	0.96	0.85	1.36	0.85		
標準偏差	0.10	0.12	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.18	0.20	0.17	0.57	0.17		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査