

表 3018 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前補正 カルシウム濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		1 (0.2)	4 (0.7)	20 (3.6)	73 (13.1)	152 (27.3)	170 (30.5)	75 (13.5)	39 (7.0)	23 (4.1)	557 (100.0)	51	608	1.44	0.29
7.0～ (%)		2 (0.3)	6 (0.8)	22 (2.8)	110 (13.8)	226 (28.3)	208 (26.0)	127 (15.9)	64 (8.0)	35 (4.4)	800 (100.0)	42	842	1.45	0.30
7.5～ (%)		3 (0.1)	24 (0.8)	125 (3.9)	404 (12.8)	816 (25.8)	905 (28.6)	496 (15.7)	244 (7.7)	151 (4.8)	3,168 (100.0)	177	3,345	1.46	0.30
8.0～ (%)	7 (0.1)	13 (0.1)	52 (0.5)	346 (3.3)	1,289 (12.3)	2,756 (26.4)	2,942 (28.1)	1,764 (16.9)	840 (8.0)	448 (4.3)	10,457 (100.0)	565	11,022	1.46	0.29
8.4～ (%)	1 (0.0)	3 (0.1)	17 (0.6)	91 (3.0)	376 (12.5)	819 (27.2)	807 (26.8)	528 (17.5)	226 (7.5)	148 (4.9)	3,016 (100.0)	155	3,171	1.47	0.29
8.5～ (%)	19 (0.1)	30 (0.1)	166 (0.5)	1,011 (2.7)	4,257 (11.5)	9,759 (26.5)	10,492 (28.5)	6,430 (17.4)	2,922 (7.9)	1,774 (4.8)	36,860 (100.0)	2,003	38,863	1.47	0.29
9.0～ (%)	30 (0.1)	43 (0.1)	199 (0.4)	1,239 (2.5)	5,301 (10.9)	12,246 (25.2)	13,826 (28.4)	8,937 (18.4)	4,250 (8.7)	2,543 (5.2)	48,614 (100.0)	2,721	51,335	1.49	0.29
9.5～ (%)	17 (0.1)	39 (0.1)	142 (0.4)	811 (2.4)	3,521 (10.4)	8,295 (24.5)	9,513 (28.1)	6,391 (18.9)	3,203 (9.5)	1,890 (5.6)	33,822 (100.0)	2,070	35,892	1.50	0.30
10.0～ (%)	3 (0.1)	1 (0.0)	23 (0.5)	103 (2.4)	447 (10.5)	1,028 (24.1)	1,186 (27.8)	870 (20.4)	388 (9.1)	224 (5.2)	4,273 (100.0)	263	4,536	1.50	0.30
10.1～ (%)	12 (0.1)	15 (0.1)	51 (0.5)	292 (2.7)	1,153 (10.5)	2,656 (24.2)	3,043 (27.8)	2,059 (18.8)	1,052 (9.6)	624 (5.7)	10,957 (100.0)	724	11,681	1.50	0.30
10.5～ (%)	6 (0.1)	9 (0.2)	39 (0.7)	183 (3.5)	618 (11.7)	1,309 (24.7)	1,420 (26.8)	942 (17.8)	497 (9.4)	279 (5.3)	5,302 (100.0)	410	5,712	1.48	0.31
11.0～ (%)	2 (0.1)	2 (0.1)	14 (0.8)	71 (4.1)	208 (12.0)	425 (24.5)	455 (26.2)	308 (17.7)	160 (9.2)	91 (5.2)	1,736 (100.0)	155	1,891	1.48	0.32
11.5～ (%)			11 (1.8)	27 (4.4)	88 (14.3)	158 (25.7)	149 (24.2)	107 (17.4)	48 (7.8)	27 (4.4)	615 (100.0)	63	678	1.44	0.31
12.0～ (%)		3 (0.8)	5 (1.3)	32 (8.0)	53 (13.3)	102 (25.5)	96 (24.0)	58 (14.5)	32 (8.0)	19 (4.8)	400 (100.0)	46	446	1.42	0.34
合計 (%)	97 (0.1)	164 (0.1)	753 (0.5)	4,373 (2.7)	17,898 (11.1)	40,747 (25.4)	45,212 (28.2)	29,092 (18.1)	13,965 (8.7)	8,276 (5.2)	160,577 (100.0)	9,445	170,022	1.49	0.30
記載なし (%)	3 (0.1)	3 (0.1)	21 (0.6)	131 (4.0)	430 (13.1)	904 (27.6)	924 (28.2)	543 (16.6)	226 (6.9)	90 (2.7)	3,275 (100.0)	4,912	8,187	1.43	0.28
総計 (%)	100 (0.1)	167 (0.1)	774 (0.5)	4,504 (2.7)	18,328 (11.2)	41,651 (25.4)	46,136 (28.2)	29,635 (18.1)	14,191 (8.7)	8,366 (5.1)	163,852 (100.0)	14,357	178,209	1.48	0.30
平均	9.40	9.31	9.28	9.24	9.21	9.22	9.23	9.26	9.28	9.28	9.24	9.31	9.24		
標準偏差	0.72	0.87	0.86	0.84	0.76	0.74	0.73	0.71	0.72	0.72	0.74	0.80	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査