

表 3034 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析後体重(kg)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												11	11		
20～ (%)				2 (3.8)	1 (1.9)	6 (11.5)	12 (23.1)	10 (19.2)	9 (17.3)	12 (23.1)	52 (100.0)	15	67	1.76	0.43
30～ (%)	4 (0.2)	2 (0.1)	5 (0.2)	15 (0.7)	66 (2.9)	151 (6.6)	367 (16.1)	584 (25.7)	548 (24.1)	534 (23.5)	2,276 (100.0)	120	2,396	1.78	0.34
40～ (%)	5 (0.1)	3 (0.0)	16 (0.2)	59 (0.7)	262 (3.1)	947 (11.0)	2,100 (24.5)	2,451 (28.5)	1,572 (18.3)	1,172 (13.6)	8,587 (100.0)	366	8,953	1.68	0.30
50～ (%)	3 (0.0)	7 (0.1)	17 (0.2)	151 (1.4)	687 (6.5)	2,466 (23.2)	3,484 (32.8)	2,286 (21.5)	940 (8.9)	575 (5.4)	10,616 (100.0)	392	11,008	1.53	0.27
60～ (%)	5 (0.1)	4 (0.1)	20 (0.3)	144 (2.1)	862 (12.4)	2,299 (33.0)	2,103 (30.1)	986 (14.1)	348 (5.0)	206 (3.0)	6,977 (100.0)	254	7,231	1.43	0.26
70～ (%)		1 (0.0)	13 (0.5)	105 (3.7)	580 (20.5)	1,099 (38.9)	623 (22.1)	259 (9.2)	93 (3.3)	50 (1.8)	2,823 (100.0)	87	2,910	1.35	0.24
80～ (%)		1 (0.1)	8 (0.8)	71 (6.8)	289 (27.8)	359 (34.5)	200 (19.2)	73 (7.0)	24 (2.3)	15 (1.4)	1,040 (100.0)	33	1,073	1.30	0.25
90～ (%)	2 (0.6)	1 (0.3)	2 (0.6)	43 (11.8)	101 (27.8)	121 (33.3)	67 (18.5)	19 (5.2)	5 (1.4)	2 (0.6)	363 (100.0)	8	371	1.25	0.24
100～ (%)			2 (1.9)	16 (15.2)	38 (36.2)	35 (33.3)	10 (9.5)	3 (2.9)		1 (1.0)	105 (100.0)	4	109	1.18	0.22
110～ (%)				2 (4.4)	24 (53.3)	12 (26.7)	5 (11.1)	1 (2.2)		1 (2.2)	45 (100.0)	1	46	1.22	0.21
120～ (%)			1 (3.2)	10 (32.3)	6 (19.4)	11 (35.5)	1 (3.2)	1 (3.2)	1 (3.2)		31 (100.0)		31	1.15	0.24
合計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	1,291	34,206	1.54	0.31
記載なし (%)												765	765		
総計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31
平均	55.51	57.83	63.19	68.22	66.16	61.81	56.56	52.19	49.11	47.46	56.45	53.94	56.35		
標準偏差	17.52	15.27	17.91	18.08	14.64	12.25	10.95	10.16	9.85	9.78	12.86	13.29	12.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査