

表 3036 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析後体重(kg)別 (血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												3	3		
20～ (%)				2 (4.2)	1 (2.1)	5 (10.4)	12 (25.0)	9 (18.8)	7 (14.6)	12 (25.0)	48 (100.0)	13	61	1.76	0.44
30～ (%)	4 (0.2)	1 (0.0)	5 (0.2)	12 (0.6)	53 (2.6)	124 (6.1)	296 (14.6)	526 (25.9)	509 (25.0)	504 (24.8)	2,034 (100.0)	108	2,142	1.80	0.34
40～ (%)	4 (0.1)	1 (0.0)	9 (0.2)	29 (0.5)	110 (2.0)	425 (7.6)	1,066 (19.1)	1,683 (30.1)	1,264 (22.6)	998 (17.9)	5,589 (100.0)	231	5,820	1.75	0.30
50～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	1 (0.0)	19 (0.6)	102 (3.2)	421 (13.2)	930 (29.2)	915 (28.7)	485 (15.2)	311 (9.8)	3,187 (100.0)	138	3,325	1.64	0.28
60～ (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	4 (0.4)	13 (1.2)	65 (6.2)	223 (21.3)	338 (32.3)	229 (21.9)	101 (9.6)	72 (6.9)	1,048 (100.0)	46	1,094	1.55	0.30
70～ (%)				5 (1.6)	36 (11.5)	112 (35.9)	95 (30.4)	43 (13.8)	15 (4.8)	6 (1.9)	312 (100.0)	6	318	1.42	0.23
80～ (%)				4 (3.3)	24 (19.8)	36 (29.8)	34 (28.1)	16 (13.2)	6 (5.0)	1 (0.8)	121 (100.0)	5	126	1.39	0.24
90～ (%)					2 (9.5)	9 (42.9)	7 (33.3)	2 (9.5)	1 (4.8)		21 (100.0)		21	1.40	0.20
100～ (%)				1 (33.3)		2 (66.7)					3 (100.0)		3	1.20	0.22
110～ (%)					2 (50.0)	2 (50.0)					4 (100.0)		4	1.16	0.12
120～ (%)															
合計 (%)	10 (0.1)	6 (0.0)	19 (0.2)	85 (0.7)	395 (3.2)	1,359 (11.0)	2,778 (22.5)	3,423 (27.7)	2,388 (19.3)	1,904 (15.4)	12,367 (100.0)	550	12,917	1.70	0.32
記載なし (%)												278	278		
総計 (%)	10 (0.1)	6 (0.0)	19 (0.2)	85 (0.7)	395 (3.2)	1,359 (11.0)	2,778 (22.5)	3,423 (27.7)	2,388 (19.3)	1,904 (15.4)	12,367 (100.0)	828	13,195	1.70	0.32
平均	44.47	53.82	46.85	52.53	54.94	54.45	51.26	47.96	45.90	44.58	48.75	47.10	48.68		
標準偏差	8.90	11.97	11.09	14.18	14.54	12.51	10.18	8.47	7.79	7.51	9.99	10.33	10.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査