

表 3038 single pool Kt/V(Kt/Vsp) nPCR(g/kg/day)別(血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	7 (35.0)		1 (5.0)	2 (10.0)	4 (20.0)	5 (25.0)	1 (5.0)				20 (100.0)		20	0.81	0.49
0.4～ (%)	2 (0.3)	8 (1.1)	28 (3.9)	62 (8.5)	164 (22.6)	238 (32.8)	139 (19.1)	53 (7.3)	21 (2.9)	11 (1.5)	726 (100.0)	2	728	1.27	0.29
0.6～ (%)		2 (0.0)	27 (0.4)	261 (4.3)	1,019 (16.8)	1,991 (32.8)	1,655 (27.2)	745 (12.3)	240 (3.9)	137 (2.3)	6,077 (100.0)	2	6,079	1.39	0.26
0.8～ (%)		3 (0.0)	9 (0.1)	176 (1.9)	1,049 (11.0)	2,881 (30.3)	3,019 (31.8)	1,560 (16.4)	518 (5.5)	285 (3.0)	9,500 (100.0)	5	9,505	1.46	0.25
1.0～ (%)				30 (0.8)	262 (7.3)	916 (25.4)	1,191 (33.0)	751 (20.8)	292 (8.1)	168 (4.7)	3,610 (100.0)	3	3,613	1.52	0.26
1.2～ (%)				2 (0.4)	23 (4.1)	109 (19.3)	178 (31.5)	128 (22.7)	72 (12.7)	53 (9.4)	565 (100.0)	4	569	1.60	0.28
1.4～ (%)						7 (15.2)	11 (23.9)	11 (23.9)	9 (19.6)	8 (17.4)	46 (100.0)	2	48	1.71	0.28
1.6～ (%)								1 (33.3)		2 (66.7)	3 (100.0)	2	5	2.26	0.47
1.8～ (%)															
2.0～ (%)								1 (100.0)			1 (100.0)	2	3	1.65	
合計 (%)	9 (0.0)	13 (0.1)	65 (0.3)	533 (2.6)	2,521 (12.3)	6,147 (29.9)	6,194 (30.1)	3,250 (15.8)	1,152 (5.6)	664 (3.2)	20,548 (100.0)	22	20,570	1.44	0.27
記載なし (%)												1,206	1,206		
総計 (%)	9 (0.0)	13 (0.1)	65 (0.3)	533 (2.6)	2,521 (12.3)	6,147 (29.9)	6,194 (30.1)	3,250 (15.8)	1,152 (5.6)	664 (3.2)	20,548 (100.0)	1,228	21,776	1.44	0.27
平均	0.37	0.60	0.63	0.76	0.81	0.85	0.88	0.91	0.92	0.94	0.87	1.22	0.87		
標準偏差	0.09	0.16	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.19	0.16	0.57	0.16		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査