

表 3043 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前アルブミン 濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)					1 (12.5)	3 (37.5)	1 (12.5)			3 (37.5)	8 (100.0)	2	10	1.72	0.63
1.5～ (%)			2 (5.0)	7 (17.5)	4 (10.0)	15 (37.5)	5 (12.5)	3 (7.5)	2 (5.0)	2 (5.0)	40 (100.0)	3	43	1.30	0.35
2.0～ (%)	2 (0.9)	2 (0.9)	4 (1.8)	14 (6.3)	27 (12.1)	62 (27.7)	62 (27.7)	29 (12.9)	13 (5.8)	9 (4.0)	224 (100.0)	15	239	1.40	0.35
2.5～ (%)		2 (0.2)	10 (0.9)	49 (4.4)	131 (11.8)	246 (22.1)	292 (26.3)	217 (19.5)	98 (8.8)	67 (6.0)	1,112 (100.0)	80	1,192	1.49	0.32
3.0～ (%)	5 (0.1)	10 (0.1)	23 (0.3)	124 (1.7)	563 (7.6)	1,562 (21.2)	2,061 (28.0)	1,544 (21.0)	842 (11.4)	629 (8.5)	7,363 (100.0)	351	7,714	1.56	0.31
3.5～ (%)	8 (0.0)	4 (0.0)	35 (0.2)	276 (1.6)	1,455 (8.3)	3,910 (22.4)	4,743 (27.2)	3,640 (20.9)	1,967 (11.3)	1,402 (8.0)	17,440 (100.0)	641	18,081	1.55	0.31
4.0～ (%)	4 (0.1)	1 (0.0)	9 (0.1)	129 (2.1)	675 (11.1)	1,534 (25.3)	1,615 (26.6)	1,121 (18.5)	559 (9.2)	427 (7.0)	6,074 (100.0)	209	6,283	1.51	0.31
4.5～ (%)			1 (0.4)	13 (4.9)	35 (13.2)	80 (30.1)	64 (24.1)	37 (13.9)	21 (7.9)	15 (5.6)	266 (100.0)	9	275	1.45	0.30
5.0～ (%)					2 (15.4)	2 (15.4)	6 (46.2)	1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)	13 (100.0)	2	15	1.49	0.27
合計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	612 (1.9)	2,893 (8.9)	7,414 (22.8)	8,849 (27.2)	6,592 (20.3)	3,503 (10.8)	2,555 (7.9)	32,540 (100.0)	1,312	33,852	1.54	0.31
記載なし (%)				6 (1.6)	23 (6.1)	92 (24.5)	123 (32.8)	81 (21.6)	37 (9.9)	13 (3.5)	375 (100.0)	744	1,119	1.52	0.25
総計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31
平均	3.46	3.24	3.38	3.59	3.67	3.66	3.64	3.63	3.63	3.63	3.64	3.57	3.64		
標準偏差	0.56	0.49	0.59	0.52	0.42	0.40	0.37	0.36	0.35	0.36	0.38	0.43	0.38		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査