

表 3053 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析前収縮期血圧(mmHg)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前収縮期血圧	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)							1 (100.0)				1 (100.0)		1	1.57	
60～ (%)			1 (1.0)	4 (3.8)	12 (11.5)	23 (22.1)	28 (26.9)	17 (16.3)	13 (12.5)	6 (5.8)	104 (100.0)	6	110	1.50	0.35
80～ (%)		2 (0.4)	1 (0.2)	11 (2.1)	34 (6.5)	120 (22.9)	133 (25.4)	111 (21.2)	68 (13.0)	43 (8.2)	523 (100.0)	38	561	1.56	0.32
100～ (%)	3 (0.1)	2 (0.1)	10 (0.4)	46 (2.0)	198 (8.4)	480 (20.4)	628 (26.7)	501 (21.3)	245 (10.4)	240 (10.2)	2,353 (100.0)	121	2,474	1.56	0.32
120～ (%)	5 (0.1)	3 (0.0)	14 (0.2)	93 (1.4)	504 (7.8)	1,364 (21.2)	1,776 (27.6)	1,361 (21.1)	771 (12.0)	554 (8.6)	6,445 (100.0)	230	6,675	1.56	0.31
140～ (%)	5 (0.1)	5 (0.1)	24 (0.2)	172 (1.8)	842 (8.7)	2,201 (22.7)	2,690 (27.7)	1,970 (20.3)	1,049 (10.8)	744 (7.7)	9,702 (100.0)	337	10,039	1.54	0.31
160～ (%)	3 (0.0)	3 (0.0)	14 (0.2)	138 (2.0)	671 (9.5)	1,742 (24.6)	1,944 (27.5)	1,403 (19.8)	679 (9.6)	477 (6.7)	7,074 (100.0)	215	7,289	1.52	0.30
180～ (%)	1 (0.0)		11 (0.4)	62 (2.3)	283 (10.6)	666 (25.0)	704 (26.4)	508 (19.1)	250 (9.4)	181 (6.8)	2,666 (100.0)	69	2,735	1.51	0.31
200～ (%)		1 (0.1)	1 (0.1)	15 (2.2)	79 (11.5)	168 (24.4)	189 (27.4)	137 (19.9)	69 (10.0)	30 (4.4)	689 (100.0)	17	706	1.49	0.29
220～ (%)				7 (4.0)	25 (14.1)	36 (20.3)	42 (23.7)	41 (23.2)	13 (7.3)	13 (7.3)	177 (100.0)	5	182	1.50	0.30
合計 (%)	17 (0.1)	16 (0.1)	76 (0.3)	548 (1.8)	2,648 (8.9)	6,800 (22.9)	8,135 (27.4)	6,049 (20.3)	3,157 (10.6)	2,288 (7.7)	29,734 (100.0)	1,038	30,772	1.54	0.31
記載なし (%)	2 (0.1)	3 (0.1)	8 (0.3)	70 (2.2)	268 (8.4)	706 (22.2)	837 (26.3)	624 (19.6)	383 (12.0)	280 (8.8)	3,181 (100.0)	1,018	4,199	1.56	0.33
総計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31
平均	141.88	141.56	147.80	153.11	153.14	152.07	150.61	150.03	148.92	147.58	150.67	145.80	150.50		
標準偏差	22.45	30.61	27.80	26.85	25.93	24.87	24.70	24.97	24.77	24.72	25.01	26.25	25.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査