

表 3054 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 透析前拡張期血圧(mmHg)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前拡張 期血圧	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)		5 (100.0)	1	6	1.56	0.23
20～ (%)				6 (5.6)	9 (8.4)	28 (26.2)	27 (25.2)	13 (12.1)	14 (13.1)	10 (9.3)	107 (100.0)	4	111	1.51	0.34
40～ (%)	2 (0.1)	3 (0.1)	12 (0.5)	30 (1.4)	170 (7.7)	462 (20.8)	606 (27.3)	500 (22.5)	254 (11.5)	179 (8.1)	2,218 (100.0)	118	2,336	1.56	0.31
60～ (%)	9 (0.1)	4 (0.0)	26 (0.2)	208 (1.7)	1,059 (8.4)	2,741 (21.8)	3,527 (28.1)	2,584 (20.6)	1,420 (11.3)	995 (7.9)	12,573 (100.0)	488	13,061	1.55	0.31
80～ (%)	2 (0.0)	6 (0.1)	15 (0.2)	142 (1.8)	707 (9.2)	1,778 (23.1)	2,090 (27.1)	1,572 (20.4)	779 (10.1)	614 (8.0)	7,705 (100.0)	232	7,937	1.54	0.31
90～ (%)	3 (0.1)	2 (0.0)	10 (0.2)	105 (2.3)	414 (9.1)	1,120 (24.6)	1,208 (26.6)	899 (19.8)	455 (10.0)	329 (7.2)	4,545 (100.0)	126	4,671	1.52	0.31
100～ (%)	1 (0.0)		11 (0.5)	53 (2.3)	254 (11.0)	611 (26.5)	607 (26.3)	424 (18.4)	202 (8.7)	146 (6.3)	2,309 (100.0)	65	2,374	1.50	0.30
120～ (%)				1 (0.7)	26 (17.8)	29 (19.9)	37 (25.3)	29 (19.9)	16 (11.0)	8 (5.5)	146 (100.0)	3	149	1.51	0.30
140～ (%)					2 (22.2)	2 (22.2)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)	9 (100.0)		9	1.53	0.32
合計 (%)	17 (0.1)	15 (0.1)	74 (0.2)	545 (1.8)	2,641 (8.9)	6,772 (22.9)	8,106 (27.4)	6,023 (20.3)	3,142 (10.6)	2,282 (7.7)	29,617 (100.0)	1,037	30,654	1.54	0.31
記載なし (%)	2 (0.1)	4 (0.1)	10 (0.3)	73 (2.2)	275 (8.3)	734 (22.3)	866 (26.3)	650 (19.7)	398 (12.1)	286 (8.7)	3,298 (100.0)	1,019	4,317	1.55	0.33
総計 (%)	19 (0.1)	19 (0.1)	84 (0.3)	618 (1.9)	2,916 (8.9)	7,506 (22.8)	8,972 (27.3)	6,673 (20.3)	3,540 (10.8)	2,568 (7.8)	32,915 (100.0)	2,056	34,971	1.54	0.31
平均	74.06	74.80	78.53	80.54	80.71	80.24	78.99	78.82	78.29	78.52	79.31	76.13	79.20		
標準偏差	15.98	15.41	17.56	15.23	15.24	14.71	14.56	14.50	14.51	14.34	14.66	15.32	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査