

表 3056 equilibrated Kt/V(eKt/V) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	103	259	2,241	12,054	33,225	35,034	14,689	4,175	1,144	647	103,571	8,944	112,515	1.23	0.24
(%)	(0.1)	(0.3)	(2.2)	(11.6)	(32.1)	(33.8)	(14.2)	(4.0)	(1.1)	(0.6)	(100.0)				
女性	31	107	597	2,986	9,170	16,734	16,634	9,022	3,233	1,841	60,355	5,339	65,694	1.41	0.29
(%)	(0.1)	(0.2)	(1.0)	(4.9)	(15.2)	(27.7)	(27.6)	(14.9)	(5.4)	(3.1)	(100.0)				
合計	134	366	2,838	15,040	42,395	51,768	31,323	13,197	4,377	2,488	163,926	14,283	178,209	1.29	0.27
(%)	(0.1)	(0.2)	(1.7)	(9.2)	(25.9)	(31.6)	(19.1)	(8.1)	(2.7)	(1.5)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	134	366	2,838	15,040	42,395	51,768	31,323	13,197	4,377	2,488	163,926	14,283	178,209	1.29	0.27
(%)	(0.1)	(0.2)	(1.7)	(9.2)	(25.9)	(31.6)	(19.1)	(8.1)	(2.7)	(1.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査