

表 3062 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)							1 (100.0)				1 (100.0)	32	33	1.49	
20～ (%)				1 (5.3)		6 (31.6)	4 (21.1)	3 (15.8)		5 (26.3)	19 (100.0)	8	27	1.65	0.49
30～ (%)	2 (0.1)	14 (0.7)	42 (2.1)	152 (7.7)	325 (16.6)	502 (25.6)	533 (27.2)	269 (13.7)	84 (4.3)	40 (2.0)	1,963 (100.0)	176	2,139	1.36	0.30
40～ (%)	24 (0.1)	49 (0.3)	323 (1.7)	1,597 (8.5)	3,922 (20.8)	6,736 (35.8)	4,349 (23.1)	1,292 (6.9)	374 (2.0)	162 (0.9)	18,828 (100.0)	1,277	20,105	1.30	0.25
50～ (%)	36 (0.1)	83 (0.2)	685 (1.8)	3,587 (9.3)	11,170 (28.9)	14,847 (38.5)	5,925 (15.3)	1,638 (4.2)	408 (1.1)	229 (0.6)	38,608 (100.0)	2,291	40,899	1.25	0.23
60～ (%)	26 (0.1)	61 (0.2)	559 (2.0)	3,300 (12.1)	10,673 (39.0)	8,968 (32.8)	2,742 (10.0)	694 (2.5)	190 (0.7)	136 (0.5)	27,349 (100.0)	1,423	28,772	1.19	0.22
70～ (%)	10 (0.1)	29 (0.3)	314 (2.9)	1,855 (17.1)	4,742 (43.6)	2,791 (25.7)	812 (7.5)	205 (1.9)	65 (0.6)	49 (0.5)	10,872 (100.0)	612	11,484	1.15	0.21
80～ (%)	2 (0.1)	10 (0.3)	160 (4.3)	863 (23.0)	1,594 (42.4)	813 (21.6)	229 (6.1)	54 (1.4)	15 (0.4)	17 (0.5)	3,757 (100.0)	193	3,950	1.12	0.22
90～ (%)	2 (0.1)	7 (0.5)	70 (5.0)	419 (30.2)	543 (39.1)	263 (19.0)	61 (4.4)	13 (0.9)	5 (0.4)	4 (0.3)	1,387 (100.0)	68	1,455	1.08	0.21
100～ (%)	1 (0.2)	3 (0.6)	35 (7.3)	176 (36.9)	163 (34.2)	66 (13.8)	22 (4.6)	5 (1.0)	1 (0.2)	5 (1.0)	477 (100.0)	29	506	1.05	0.23
110～ (%)		3 (1.6)	26 (14.1)	50 (27.2)	65 (35.3)	31 (16.8)	6 (3.3)	2 (1.1)	1 (0.5)		184 (100.0)	14	198	1.03	0.22
120～ (%)			27 (21.4)	54 (42.9)	28 (22.2)	11 (8.7)	5 (4.0)		1 (0.8)		126 (100.0)	3	129	0.96	0.22
合計 (%)	103 (0.1)	259 (0.3)	2,241 (2.2)	12,054 (11.6)	33,225 (32.1)	35,034 (33.8)	14,689 (14.2)	4,175 (4.0)	1,144 (1.1)	647 (0.6)	103,571 (100.0)	6,126	109,697	1.23	0.24
記載なし (%)												2,818	2,818		
総計 (%)	103 (0.1)	259 (0.3)	2,241 (2.2)	12,054 (11.6)	33,225 (32.1)	35,034 (33.8)	14,689 (14.2)	4,175 (4.0)	1,144 (1.1)	647 (0.6)	103,571 (100.0)	8,944	112,515	1.23	0.24
平均	58.88	59.93	64.19	64.00	62.15	58.02	54.97	53.74	53.75	55.70	59.51	58.09	59.43		
標準偏差	11.92	14.67	16.95	14.58	11.75	10.38	10.28	10.31	11.06	12.26	12.02	12.55	12.05		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査