

表 3064 equilibrated Kt/V(eKt/V) nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	72 (19.5)	21 (5.7)	36 (9.8)	82 (22.2)	71 (19.2)	53 (14.4)	25 (6.8)	5 (1.4)	3 (0.8)	1 (0.3)	369 (100.0)		369	0.88	0.43
0.4～ (%)	47 (0.6)	176 (2.1)	732 (8.7)	1,685 (20.0)	2,441 (29.0)	2,008 (23.9)	861 (10.2)	317 (3.8)	99 (1.2)	49 (0.6)	8,415 (100.0)	3	8,418	1.13	0.29
0.6～ (%)	15 (0.0)	140 (0.3)	1,397 (2.7)	6,902 (13.5)	15,554 (30.5)	15,355 (30.1)	7,719 (15.2)	2,743 (5.4)	762 (1.5)	355 (0.7)	50,942 (100.0)	14	50,956	1.23	0.25
0.8～ (%)		24 (0.0)	581 (0.8)	5,199 (7.4)	18,371 (26.1)	23,675 (33.6)	14,158 (20.1)	5,720 (8.1)	1,809 (2.6)	937 (1.3)	70,474 (100.0)	37	70,511	1.31	0.25
1.0～ (%)		3 (0.0)	84 (0.3)	1,060 (3.8)	5,297 (18.8)	9,180 (32.6)	7,037 (25.0)	3,450 (12.2)	1,275 (4.5)	809 (2.9)	28,195 (100.0)	53	28,248	1.39	0.27
1.2～ (%)		1 (0.0)	8 (0.2)	93 (1.9)	606 (12.4)	1,367 (27.9)	1,371 (28.0)	831 (17.0)	358 (7.3)	257 (5.3)	4,892 (100.0)	24	4,916	1.48	0.29
1.4～ (%)				15 (2.8)	52 (9.7)	116 (21.6)	131 (24.4)	112 (20.9)	58 (10.8)	52 (9.7)	536 (100.0)	19	555	1.55	0.34
1.6～ (%)				3 (4.1)	3 (4.1)	12 (16.4)	17 (23.3)	17 (23.3)	11 (15.1)	10 (13.7)	73 (100.0)	6	79	1.64	0.39
1.8～ (%)		1 (5.6)					3 (16.7)	2 (11.1)		12 (66.7)	18 (100.0)	7	25	2.11	0.63
2.0～ (%)				1 (8.3)		2 (16.7)	1 (8.3)		2 (16.7)	6 (50.0)	12 (100.0)	26	38	2.00	0.66
合計 (%)	134 (0.1)	366 (0.2)	2,838 (1.7)	15,040 (9.2)	42,395 (25.9)	51,768 (31.6)	31,323 (19.1)	13,197 (8.1)	4,377 (2.7)	2,488 (1.5)	163,926 (100.0)	189	164,115	1.29	0.27
記載なし (%)												14,094	14,094		
総計 (%)	134 (0.1)	366 (0.2)	2,838 (1.7)	15,040 (9.2)	42,395 (25.9)	51,768 (31.6)	31,323 (19.1)	13,197 (8.1)	4,377 (2.7)	2,488 (1.5)	163,926 (100.0)	14,283	178,209	1.29	0.27
平均	0.42	0.60	0.69	0.77	0.83	0.87	0.90	0.93	0.95	0.99	0.86	1.30	0.86		
標準偏差	0.12	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.19	0.22	0.17	0.52	0.18		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査