

表 3065 equilibrated Kt/V(eKt/V) nPCR(g/kg/day)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	56 (23.5)	16 (6.7)	23 (9.7)	53 (22.3)	46 (19.3)	27 (11.3)	15 (6.3)	1 (0.4)	1 (0.4)		238 (100.0)		238	0.82	0.42
0.4～ (%)	34 (0.6)	125 (2.3)	565 (10.4)	1,241 (22.8)	1,740 (31.9)	1,252 (23.0)	366 (6.7)	96 (1.8)	25 (0.5)	9 (0.2)	5,453 (100.0)	2	5,455	1.08	0.26
0.6～ (%)	13 (0.0)	101 (0.3)	1,116 (3.3)	5,516 (16.2)	12,102 (35.5)	10,355 (30.3)	3,738 (11.0)	864 (2.5)	222 (0.7)	98 (0.3)	34,125 (100.0)	8	34,133	1.18	0.22
0.8～ (%)		13 (0.0)	463 (1.0)	4,286 (9.5)	14,635 (32.6)	16,200 (36.0)	6,732 (15.0)	1,907 (4.2)	475 (1.1)	244 (0.5)	44,955 (100.0)	20	44,975	1.24	0.22
1.0～ (%)		2 (0.0)	68 (0.4)	872 (5.4)	4,199 (26.1)	6,205 (38.6)	3,188 (19.8)	1,016 (6.3)	324 (2.0)	201 (1.3)	16,075 (100.0)	27	16,102	1.31	0.23
1.2～ (%)		1 (0.0)	6 (0.2)	71 (2.9)	463 (19.2)	913 (37.8)	574 (23.8)	246 (10.2)	82 (3.4)	59 (2.4)	2,415 (100.0)	13	2,428	1.38	0.26
1.4～ (%)				13 (5.0)	37 (14.1)	73 (27.9)	67 (25.6)	38 (14.5)	13 (5.0)	21 (8.0)	262 (100.0)	10	272	1.46	0.33
1.6～ (%)				2 (6.5)	3 (9.7)	7 (22.6)	8 (25.8)	7 (22.6)	1 (3.2)	3 (9.7)	31 (100.0)	3	34	1.53	0.39
1.8～ (%)		1 (10.0)					1 (10.0)			8 (80.0)	10 (100.0)	4	14	2.18	0.72
2.0～ (%)						2 (28.6)			1 (14.3)	4 (57.1)	7 (100.0)	21	28	2.18	0.67
合計 (%)	103 (0.1)	259 (0.3)	2,241 (2.2)	12,054 (11.6)	33,225 (32.1)	35,034 (33.8)	14,689 (14.2)	4,175 (4.0)	1,144 (1.1)	647 (0.6)	103,571 (100.0)	108	103,679	1.23	0.24
記載なし (%)												8,836	8,836		
総計 (%)	103 (0.1)	259 (0.3)	2,241 (2.2)	12,054 (11.6)	33,225 (32.1)	35,034 (33.8)	14,689 (14.2)	4,175 (4.0)	1,144 (1.1)	647 (0.6)	103,571 (100.0)	8,944	112,515	1.23	0.24
平均	0.41	0.59	0.70	0.78	0.83	0.87	0.90	0.92	0.94	1.00	0.85	1.37	0.85		
標準偏差	0.12	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.25	0.17	0.59	0.17		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査