

表 3072 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前補正 カルシウム濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		2 (0.4)	13 (2.3)	63 (11.3)	157 (28.2)	189 (33.9)	81 (14.5)	36 (6.5)	10 (1.8)	6 (1.1)	557 (100.0)	51	608	1.25	0.26
7.0～ (%)		4 (0.5)	12 (1.5)	91 (11.4)	242 (30.3)	233 (29.1)	131 (16.4)	55 (6.9)	22 (2.8)	10 (1.3)	800 (100.0)	42	842	1.26	0.27
7.5～ (%)	1 (0.0)	11 (0.3)	76 (2.4)	371 (11.7)	824 (26.0)	1,013 (32.0)	527 (16.6)	225 (7.1)	74 (2.3)	47 (1.5)	3,169 (100.0)	176	3,345	1.27	0.27
8.0～ (%)	8 (0.1)	25 (0.2)	214 (2.0)	1,078 (10.3)	2,836 (27.1)	3,330 (31.8)	1,802 (17.2)	807 (7.7)	221 (2.1)	143 (1.4)	10,464 (100.0)	558	11,022	1.27	0.27
8.4～ (%)	1 (0.0)	9 (0.3)	59 (2.0)	300 (10.0)	839 (27.8)	929 (30.8)	545 (18.1)	219 (7.3)	81 (2.7)	33 (1.1)	3,015 (100.0)	156	3,171	1.28	0.27
8.5～ (%)	25 (0.1)	76 (0.2)	622 (1.7)	3,537 (9.6)	9,849 (26.7)	11,804 (32.0)	6,821 (18.5)	2,661 (7.2)	975 (2.6)	506 (1.4)	36,876 (100.0)	1,987	38,863	1.28	0.27
9.0～ (%)	45 (0.1)	87 (0.2)	795 (1.6)	4,269 (8.8)	12,406 (25.5)	15,550 (32.0)	9,437 (19.4)	3,931 (8.1)	1,346 (2.8)	764 (1.6)	48,630 (100.0)	2,705	51,335	1.30	0.27
9.5～ (%)	24 (0.1)	77 (0.2)	505 (1.5)	2,807 (8.3)	8,494 (25.1)	10,572 (31.2)	6,808 (20.1)	2,991 (8.8)	976 (2.9)	585 (1.7)	33,839 (100.0)	2,053	35,892	1.31	0.27
10.0～ (%)	3 (0.1)	8 (0.2)	72 (1.7)	368 (8.6)	1,009 (23.6)	1,369 (32.0)	901 (21.1)	366 (8.6)	116 (2.7)	65 (1.5)	4,277 (100.0)	259	4,536	1.31	0.27
10.1～ (%)	13 (0.1)	27 (0.2)	190 (1.7)	940 (8.6)	2,725 (24.9)	3,393 (31.0)	2,171 (19.8)	1,006 (9.2)	323 (2.9)	174 (1.6)	10,962 (100.0)	719	11,681	1.31	0.28
10.5～ (%)	8 (0.2)	19 (0.4)	122 (2.3)	513 (9.7)	1,354 (25.5)	1,594 (30.0)	1,005 (18.9)	469 (8.8)	131 (2.5)	90 (1.7)	5,305 (100.0)	407	5,712	1.29	0.28
11.0～ (%)	2 (0.1)	6 (0.3)	55 (3.2)	175 (10.1)	436 (25.1)	509 (29.3)	329 (18.9)	152 (8.7)	42 (2.4)	34 (2.0)	1,740 (100.0)	151	1,891	1.29	0.29
11.5～ (%)		2 (0.3)	17 (2.8)	87 (14.1)	165 (26.8)	158 (25.6)	118 (19.2)	51 (8.3)	8 (1.3)	10 (1.6)	616 (100.0)	62	678	1.26	0.29
12.0～ (%)		4 (1.0)	12 (3.0)	65 (16.3)	103 (25.8)	109 (27.3)	66 (16.5)	23 (5.8)	12 (3.0)	6 (1.5)	400 (100.0)	46	446	1.24	0.31
合計 (%)	130 (0.1)	357 (0.2)	2,764 (1.7)	14,664 (9.1)	41,439 (25.8)	50,752 (31.6)	30,742 (19.1)	12,992 (8.1)	4,337 (2.7)	2,473 (1.5)	160,650 (100.0)	9,372	170,022	1.29	0.27
記載なし (%)	4 (0.1)	9 (0.3)	74 (2.3)	376 (11.5)	956 (29.2)	1,016 (31.0)	581 (17.7)	205 (6.3)	40 (1.2)	15 (0.5)	3,276 (100.0)	4,911	8,187	1.25	0.25
総計 (%)	134 (0.1)	366 (0.2)	2,838 (1.7)	15,040 (9.2)	42,395 (25.9)	51,768 (31.6)	31,323 (19.1)	13,197 (8.1)	4,377 (2.7)	2,488 (1.5)	163,926 (100.0)	14,283	178,209	1.29	0.27
平均	9.36	9.28	9.24	9.21	9.22	9.23	9.27	9.29	9.27	9.29	9.24	9.31	9.24		
標準偏差	0.70	0.87	0.82	0.79	0.74	0.73	0.72	0.72	0.70	0.73	0.74	0.80	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査