

表 3083 equilibrated Kt/V(eKt/V) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	9	32	273	1,888	6,116	7,102	3,411	1,109	382	235	20,557	1,219	21,776	1.27	0.25
(%)	(0.0)	(0.2)	(1.3)	(9.2)	(29.8)	(34.5)	(16.6)	(5.4)	(1.9)	(1.1)	(100.0)				
女性	11	12	63	323	1,386	3,037	3,719	2,263	910	655	12,379	816	13,195	1.48	0.30
(%)	(0.1)	(0.1)	(0.5)	(2.6)	(11.2)	(24.5)	(30.0)	(18.3)	(7.4)	(5.3)	(100.0)				
合計	20	44	336	2,211	7,502	10,139	7,130	3,372	1,292	890	32,936	2,035	34,971	1.35	0.29
(%)	(0.1)	(0.1)	(1.0)	(6.7)	(22.8)	(30.8)	(21.6)	(10.2)	(3.9)	(2.7)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	20	44	336	2,211	7,502	10,139	7,130	3,372	1,292	890	32,936	2,035	34,971	1.35	0.29
(%)	(0.1)	(0.1)	(1.0)	(6.7)	(22.8)	(30.8)	(21.6)	(10.2)	(3.9)	(2.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査