

表 3088 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												11	11		
20～ (%)			2 (3.8)	1 (1.9)	6 (11.3)	14 (26.4)	12 (22.6)	7 (13.2)	3 (5.7)	8 (15.1)	53 (100.0)	14	67	1.53	0.43
30～ (%)	4 (0.2)	4 (0.2)	14 (0.6)	62 (2.7)	188 (8.2)	394 (17.3)	656 (28.8)	536 (23.5)	252 (11.1)	170 (7.5)	2,280 (100.0)	116	2,396	1.55	0.32
40～ (%)	6 (0.1)	7 (0.1)	54 (0.6)	239 (2.8)	966 (11.2)	2,244 (26.1)	2,659 (30.9)	1,475 (17.2)	544 (6.3)	398 (4.6)	8,592 (100.0)	361	8,953	1.47	0.29
50～ (%)	3 (0.0)	8 (0.1)	98 (0.9)	556 (5.2)	2,289 (21.5)	3,898 (36.7)	2,370 (22.3)	868 (8.2)	340 (3.2)	192 (1.8)	10,622 (100.0)	386	11,008	1.34	0.26
60～ (%)	5 (0.1)	13 (0.2)	78 (1.1)	565 (8.1)	2,263 (32.4)	2,490 (35.7)	1,004 (14.4)	365 (5.2)	105 (1.5)	94 (1.3)	6,982 (100.0)	249	7,231	1.26	0.25
70～ (%)		7 (0.2)	35 (1.2)	412 (14.6)	1,168 (41.4)	758 (26.9)	305 (10.8)	83 (2.9)	36 (1.3)	19 (0.7)	2,823 (100.0)	87	2,910	1.19	0.23
80～ (%)		2 (0.2)	30 (2.9)	223 (21.4)	412 (39.6)	242 (23.3)	85 (8.2)	29 (2.8)	8 (0.8)	9 (0.9)	1,040 (100.0)	33	1,073	1.15	0.24
90～ (%)	2 (0.6)	1 (0.3)	15 (4.1)	93 (25.6)	134 (36.9)	79 (21.8)	30 (8.3)	7 (1.9)	2 (0.6)		363 (100.0)	8	371	1.11	0.23
100～ (%)		2 (1.9)	7 (6.7)	34 (32.4)	43 (41.0)	13 (12.4)	5 (4.8)		1 (1.0)		105 (100.0)	4	109	1.05	0.20
110～ (%)			1 (2.2)	13 (28.9)	21 (46.7)	6 (13.3)	3 (6.7)		1 (2.2)		45 (100.0)	1	46	1.09	0.20
120～ (%)			2 (6.5)	13 (41.9)	12 (38.7)	1 (3.2)	1 (3.2)	2 (6.5)			31 (100.0)		31	1.04	0.24
合計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	1,270	34,206	1.35	0.29
記載なし (%)												765	765		
総計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	2,035	34,971	1.35	0.29
平均	55.01	61.85	62.95	65.82	62.24	57.01	52.15	49.28	48.37	48.27	56.44	54.00	56.35		
標準偏差	17.20	17.04	16.95	15.85	12.92	11.06	10.51	10.27	10.33	10.20	12.86	13.30	12.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査