

表 3089 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析後体重(kg)別 (血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												8	8		
20～ (%)					1 (25.0)		2 (50.0)	1 (25.0)			4 (100.0)	2	6	1.47	0.30
30～ (%)		1 (0.4)	3 (1.2)	12 (5.0)	32 (13.2)	75 (31.0)	66 (27.3)	31 (12.8)	12 (5.0)	10 (4.1)	242 (100.0)	12	254	1.41	0.31
40～ (%)	1 (0.0)	4 (0.1)	29 (1.0)	138 (4.6)	502 (16.7)	1,103 (36.8)	814 (27.1)	269 (9.0)	81 (2.7)	58 (1.9)	2,999 (100.0)	134	3,133	1.36	0.25
50～ (%)	2 (0.0)	6 (0.1)	82 (1.1)	474 (6.4)	1,893 (25.5)	2,882 (38.8)	1,401 (18.9)	442 (5.9)	170 (2.3)	80 (1.1)	7,432 (100.0)	251	7,683	1.30	0.24
60～ (%)	4 (0.1)	9 (0.2)	71 (1.2)	519 (8.7)	2,060 (34.7)	2,104 (35.5)	763 (12.9)	267 (4.5)	76 (1.3)	61 (1.0)	5,934 (100.0)	203	6,137	1.24	0.24
70～ (%)		7 (0.3)	35 (1.4)	388 (15.5)	1,057 (42.1)	646 (25.7)	257 (10.2)	72 (2.9)	32 (1.3)	17 (0.7)	2,511 (100.0)	81	2,592	1.18	0.23
80～ (%)		2 (0.2)	28 (3.0)	209 (22.7)	370 (40.3)	203 (22.1)	72 (7.8)	19 (2.1)	7 (0.8)	9 (1.0)	919 (100.0)	28	947	1.14	0.24
90～ (%)	2 (0.6)	1 (0.3)	15 (4.4)	91 (26.6)	127 (37.1)	71 (20.8)	27 (7.9)	6 (1.8)	2 (0.6)		342 (100.0)	8	350	1.10	0.23
100～ (%)		2 (2.0)	7 (6.9)	33 (32.4)	43 (42.2)	11 (10.8)	5 (4.9)		1 (1.0)		102 (100.0)	4	106	1.05	0.20
110～ (%)			1 (2.4)	11 (26.8)	19 (46.3)	6 (14.6)	3 (7.3)		1 (2.4)		41 (100.0)	1	42	1.10	0.21
120～ (%)			2 (6.5)	13 (41.9)	12 (38.7)	1 (3.2)	1 (3.2)	2 (6.5)			31 (100.0)		31	1.04	0.24
合計 (%)	9 (0.0)	32 (0.2)	273 (1.3)	1,888 (9.2)	6,116 (29.8)	7,102 (34.5)	3,411 (16.6)	1,109 (5.4)	382 (1.9)	235 (1.1)	20,557 (100.0)	732	21,289	1.27	0.25
記載なし (%)												487	487		
総計 (%)	9 (0.0)	32 (0.2)	273 (1.3)	1,888 (9.2)	6,116 (29.8)	7,102 (34.5)	3,411 (16.6)	1,109 (5.4)	382 (1.9)	235 (1.1)	20,557 (100.0)	1,219	21,776	1.27	0.25
平均	67.78	66.19	66.27	67.95	64.23	59.35	56.95	56.63	56.79	57.00	61.08	58.99	61.01		
標準偏差	16.73	16.60	16.28	15.09	12.14	10.46	10.50	10.55	11.02	11.04	12.15	13.02	12.19		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査