

表 3090 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												3	3		
20～ (%)			2 (4.1)	1 (2.0)	5 (10.2)	14 (28.6)	10 (20.4)	6 (12.2)	3 (6.1)	8 (16.3)	49 (100.0)	12	61	1.53	0.44
30～ (%)	4 (0.2)	3 (0.1)	11 (0.5)	50 (2.5)	156 (7.7)	319 (15.7)	590 (28.9)	505 (24.8)	240 (11.8)	160 (7.9)	2,038 (100.0)	104	2,142	1.56	0.32
40～ (%)	5 (0.1)	3 (0.1)	25 (0.4)	101 (1.8)	464 (8.3)	1,141 (20.4)	1,845 (33.0)	1,206 (21.6)	463 (8.3)	340 (6.1)	5,593 (100.0)	227	5,820	1.53	0.29
50～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	16 (0.5)	82 (2.6)	396 (12.4)	1,016 (31.8)	969 (30.4)	426 (13.4)	170 (5.3)	112 (3.5)	3,190 (100.0)	135	3,325	1.44	0.27
60～ (%)	1 (0.1)	4 (0.4)	7 (0.7)	46 (4.4)	203 (19.4)	386 (36.8)	241 (23.0)	98 (9.4)	29 (2.8)	33 (3.1)	1,048 (100.0)	46	1,094	1.36	0.28
70～ (%)				24 (7.7)	111 (35.6)	112 (35.9)	48 (15.4)	11 (3.5)	4 (1.3)	2 (0.6)	312 (100.0)	6	318	1.25	0.22
80～ (%)			2 (1.7)	14 (11.6)	42 (34.7)	39 (32.2)	13 (10.7)	10 (8.3)	1 (0.8)		121 (100.0)	5	126	1.23	0.23
90～ (%)				2 (9.5)	7 (33.3)	8 (38.1)	3 (14.3)	1 (4.8)			21 (100.0)		21	1.24	0.19
100～ (%)				1 (33.3)		2 (66.7)					3 (100.0)		3	1.09	0.21
110～ (%)				2 (50.0)	2 (50.0)						4 (100.0)		4	1.02	0.10
120～ (%)															
合計 (%)	11 (0.1)	12 (0.1)	63 (0.5)	323 (2.6)	1,386 (11.2)	3,037 (24.5)	3,719 (30.0)	2,263 (18.3)	910 (7.4)	655 (5.3)	12,379 (100.0)	538	12,917	1.48	0.30
記載なし (%)												278	278		
総計 (%)	11 (0.1)	12 (0.1)	63 (0.5)	323 (2.6)	1,386 (11.2)	3,037 (24.5)	3,719 (30.0)	2,263 (18.3)	910 (7.4)	655 (5.3)	12,379 (100.0)	816	13,195	1.48	0.30
平均	44.56	50.30	48.55	53.34	53.47	51.54	47.75	45.69	44.83	45.14	48.74	47.21	48.68		
標準偏差	8.44	12.57	11.43	14.41	12.60	10.47	8.38	7.96	7.63	7.78	9.99	10.34	10.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査