

表 3091 equilibrated Kt/V(eKt/V) nPCR(g/kg/day)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

nPCR	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	12 (27.9)	4 (9.3)	1 (2.3)	11 (25.6)	5 (11.6)	6 (14.0)	2 (4.7)		1 (2.3)	1 (2.3)	43 (100.0)		43	0.82	0.50
0.4～ (%)	8 (0.7)	22 (2.0)	61 (5.4)	196 (17.4)	349 (30.9)	269 (23.8)	136 (12.1)	55 (4.9)	26 (2.3)	6 (0.5)	1,128 (100.0)	2	1,130	1.17	0.29
0.6～ (%)		14 (0.2)	179 (2.0)	915 (10.1)	2,550 (28.1)	2,783 (30.7)	1,637 (18.1)	634 (7.0)	213 (2.3)	143 (1.6)	9,068 (100.0)	5	9,073	1.28	0.27
0.8～ (%)		4 (0.0)	81 (0.5)	865 (5.8)	3,381 (22.7)	4,866 (32.7)	3,315 (22.3)	1,487 (10.0)	530 (3.6)	344 (2.3)	14,873 (100.0)	7	14,880	1.35	0.27
1.0～ (%)			11 (0.2)	209 (3.2)	1,100 (16.9)	1,903 (29.2)	1,689 (25.9)	942 (14.4)	380 (5.8)	291 (4.5)	6,525 (100.0)	6	6,531	1.43	0.29
1.2～ (%)			3 (0.3)	14 (1.2)	111 (9.6)	294 (25.4)	313 (27.0)	221 (19.1)	119 (10.3)	83 (7.2)	1,158 (100.0)	9	1,167	1.53	0.31
1.4～ (%)				1 (0.8)	6 (4.7)	17 (13.4)	35 (27.6)	31 (24.4)	20 (15.7)	17 (13.4)	127 (100.0)	1	128	1.66	0.35
1.6～ (%)						1 (8.3)	2 (16.7)	2 (16.7)	3 (25.0)	4 (33.3)	12 (100.0)	1	13	1.85	0.31
1.8～ (%)												1	1		
2.0～ (%)							1 (50.0)			1 (50.0)	2 (100.0)	4	6	2.16	1.02
合計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	36	32,972	1.35	0.29
記載なし (%)												1,999	1,999		
総計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	2,035	34,971	1.35	0.29
平均	0.39	0.58	0.72	0.79	0.84	0.88	0.91	0.94	0.96	0.98	0.88	1.25	0.88		
標準偏差	0.09	0.14	0.15	0.16	0.15	0.16	0.17	0.17	0.19	0.19	0.17	0.60	0.17		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査