

表 3092 equilibrated Kt/V(eKt/V) nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	7 (35.0)	1 (5.0)		6 (30.0)	5 (25.0)	1 (5.0)					20 (100.0)		20	0.71	0.43
0.4～ (%)	2 (0.3)	17 (2.3)	50 (6.9)	149 (20.5)	265 (36.5)	154 (21.2)	63 (8.7)	16 (2.2)	9 (1.2)	1 (0.1)	726 (100.0)	2	728	1.11	0.26
0.6～ (%)		10 (0.2)	148 (2.4)	792 (13.0)	2,051 (33.8)	1,946 (32.0)	768 (12.6)	235 (3.9)	74 (1.2)	53 (0.9)	6,077 (100.0)	2	6,079	1.22	0.24
0.8～ (%)		4 (0.0)	66 (0.7)	751 (7.9)	2,805 (29.5)	3,461 (36.4)	1,640 (17.3)	505 (5.3)	168 (1.8)	104 (1.1)	9,504 (100.0)	1	9,505	1.28	0.24
1.0～ (%)			8 (0.2)	177 (4.9)	887 (24.6)	1,328 (36.8)	790 (21.9)	274 (7.6)	89 (2.5)	58 (1.6)	3,611 (100.0)	2	3,613	1.33	0.24
1.2～ (%)			1 (0.2)	13 (2.3)	97 (17.1)	202 (35.6)	135 (23.8)	69 (12.2)	36 (6.3)	14 (2.5)	567 (100.0)	2	569	1.41	0.28
1.4～ (%)					6 (12.8)	10 (21.3)	13 (27.7)	10 (21.3)	6 (12.8)	2 (4.3)	47 (100.0)	1	48	1.53	0.31
1.6～ (%)							1 (25.0)			3 (75.0)	4 (100.0)	1	5	2.02	0.32
1.8～ (%)															
2.0～ (%)							1 (100.0)				1 (100.0)	2	3	1.44	
合計 (%)	9 (0.0)	32 (0.2)	273 (1.3)	1,888 (9.2)	6,116 (29.8)	7,102 (34.5)	3,411 (16.6)	1,109 (5.4)	382 (1.9)	235 (1.1)	20,557 (100.0)	13	20,570	1.27	0.25
記載なし (%)												1,206	1,206		
総計 (%)	9 (0.0)	32 (0.2)	273 (1.3)	1,888 (9.2)	6,116 (29.8)	7,102 (34.5)	3,411 (16.6)	1,109 (5.4)	382 (1.9)	235 (1.1)	20,557 (100.0)	1,219	21,776	1.27	0.25
平均	0.37	0.60	0.72	0.80	0.85	0.88	0.91	0.92	0.94	0.94	0.87	1.28	0.87		
標準偏差	0.09	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.17	0.19	0.19	0.16	0.71	0.16		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査