

表 3093 equilibrated Kt/V(eKt/V) nPCR(g/kg/day)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

nPCR	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)	5 (21.7)	3 (13.0)	1 (4.3)	5 (21.7)		5 (21.7)	2 (8.7)		1 (4.3)	1 (4.3)	23 (100.0)		23	0.91	0.55
0.4～ (%)	6 (1.5)	5 (1.2)	11 (2.7)	47 (11.7)	84 (20.9)	115 (28.6)	73 (18.2)	39 (9.7)	17 (4.2)	5 (1.2)	402 (100.0)		402	1.28	0.33
0.6～ (%)		4 (0.1)	31 (1.0)	123 (4.1)	499 (16.7)	837 (28.0)	869 (29.1)	399 (13.3)	139 (4.6)	90 (3.0)	2,991 (100.0)	3	2,994	1.40	0.28
0.8～ (%)			15 (0.3)	114 (2.1)	576 (10.7)	1,405 (26.2)	1,675 (31.2)	982 (18.3)	362 (6.7)	240 (4.5)	5,369 (100.0)	6	5,375	1.48	0.28
1.0～ (%)			3 (0.1)	32 (1.1)	213 (7.3)	575 (19.7)	899 (30.9)	668 (22.9)	291 (10.0)	233 (8.0)	2,914 (100.0)	4	2,918	1.57	0.29
1.2～ (%)			2 (0.3)	1 (0.2)	14 (2.4)	92 (15.6)	178 (30.1)	152 (25.7)	83 (14.0)	69 (11.7)	591 (100.0)	7	598	1.64	0.30
1.4～ (%)				1 (1.3)		7 (8.8)	22 (27.5)	21 (26.3)	14 (17.5)	15 (18.8)	80 (100.0)		80	1.74	0.35
1.6～ (%)						1 (12.5)	1 (12.5)	2 (25.0)	3 (37.5)	1 (12.5)	8 (100.0)		8	1.76	0.28
1.8～ (%)												1	1		
2.0～ (%)										1 (100.0)	1 (100.0)	2	3	2.88	
合計 (%)	11 (0.1)	12 (0.1)	63 (0.5)	323 (2.6)	1,386 (11.2)	3,037 (24.5)	3,719 (30.0)	2,263 (18.3)	910 (7.4)	655 (5.3)	12,379 (100.0)	23	12,402	1.48	0.30
記載なし (%)												793	793		
総計 (%)	11 (0.1)	12 (0.1)	63 (0.5)	323 (2.6)	1,386 (11.2)	3,037 (24.5)	3,719 (30.0)	2,263 (18.3)	910 (7.4)	655 (5.3)	12,379 (100.0)	816	13,195	1.48	0.30
平均	0.40	0.53	0.72	0.77	0.83	0.88	0.91	0.94	0.97	0.99	0.90	1.24	0.90		
標準偏差	0.10	0.14	0.18	0.18	0.16	0.16	0.17	0.17	0.19	0.19	0.18	0.54	0.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査