

表 3095 equilibrated Kt/V(eKt/V) %クレアチニン産生速度(%)別(血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)		11 (1.1)	86 (8.6)	211 (21.1)	342 (34.1)	231 (23.1)	84 (8.4)	26 (2.6)	5 (0.5)	6 (0.6)	1,002 (100.0)		1,002	1.12	0.26
60～ (%)	2 (0.2)	6 (0.7)	32 (3.6)	154 (17.4)	310 (35.0)	230 (26.0)	101 (11.4)	33 (3.7)	10 (1.1)	8 (0.9)	886 (100.0)		886	1.18	0.26
70～ (%)	1 (0.1)	5 (0.3)	37 (2.4)	228 (14.5)	515 (32.8)	503 (32.0)	187 (11.9)	59 (3.8)	23 (1.5)	13 (0.8)	1,571 (100.0)		1,571	1.21	0.25
80～ (%)	2 (0.1)	4 (0.2)	41 (1.6)	278 (11.0)	768 (30.4)	868 (34.4)	372 (14.7)	124 (4.9)	40 (1.6)	29 (1.1)	2,526 (100.0)	3	2,529	1.25	0.25
90～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	28 (0.9)	294 (9.2)	945 (29.5)	1,145 (35.7)	540 (16.8)	158 (4.9)	57 (1.8)	37 (1.2)	3,207 (100.0)	1	3,208	1.27	0.24
100～ (%)		1 (0.0)	27 (0.8)	283 (7.9)	1,052 (29.3)	1,275 (35.5)	640 (17.8)	197 (5.5)	67 (1.9)	49 (1.4)	3,591 (100.0)	1	3,592	1.28	0.24
110～ (%)	1 (0.0)	1 (0.0)	12 (0.4)	216 (6.4)	933 (27.8)	1,238 (36.9)	616 (18.4)	212 (6.3)	80 (2.4)	43 (1.3)	3,352 (100.0)		3,352	1.30	0.24
120～ (%)	1 (0.0)	2 (0.1)	5 (0.2)	118 (5.1)	639 (27.5)	819 (35.3)	481 (20.7)	170 (7.3)	57 (2.5)	28 (1.2)	2,320 (100.0)	1	2,321	1.31	0.24
130～ (%)			4 (0.3)	62 (4.9)	385 (30.5)	468 (37.1)	237 (18.8)	66 (5.2)	27 (2.1)	14 (1.1)	1,263 (100.0)		1,263	1.29	0.23
140～ (%)	1 (0.1)		1 (0.1)	44 (5.3)	227 (27.1)	324 (38.7)	153 (18.3)	63 (7.5)	16 (1.9)	8 (1.0)	837 (100.0)	3	840	1.30	0.24
合計 (%)	9 (0.0)	32 (0.2)	273 (1.3)	1,888 (9.2)	6,116 (29.8)	7,101 (34.5)	3,411 (16.6)	1,108 (5.4)	382 (1.9)	235 (1.1)	20,555 (100.0)	9	20,564	1.27	0.25
記載なし (%)						1 (50.0)		1 (50.0)			2 (100.0)	1,210	1,212	1.49	0.16
総計 (%)	9 (0.0)	32 (0.2)	273 (1.3)	1,888 (9.2)	6,116 (29.8)	7,102 (34.5)	3,411 (16.6)	1,109 (5.4)	382 (1.9)	235 (1.1)	20,557 (100.0)	1,219	21,776	1.27	0.25
平均	97.74	67.50	74.15	91.07	100.36	103.73	105.78	106.50	107.28	104.35	101.67	131.91	101.69		
標準偏差	32.23	28.33	26.23	25.59	24.30	22.50	21.54	21.98	21.62	21.98	23.82	69.16	23.86		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査