

表 3097 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前アルブミン濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)				1 (12.5)	2 (25.0)	2 (25.0)			1 (12.5)	2 (25.0)	8 (100.0)	2	10	1.54	0.62
1.5～ (%)		1 (2.5)	5 (12.5)	7 (17.5)	13 (32.5)	7 (17.5)	3 (7.5)	2 (5.0)	1 (2.5)	1 (2.5)	40 (100.0)	3	43	1.14	0.33
2.0～ (%)	2 (0.9)	2 (0.9)	15 (6.7)	24 (10.7)	65 (29.0)	62 (27.7)	33 (14.7)	13 (5.8)	3 (1.3)	5 (2.2)	224 (100.0)	15	239	1.22	0.32
2.5～ (%)		6 (0.5)	34 (3.0)	117 (10.5)	267 (23.9)	318 (28.5)	219 (19.6)	102 (9.1)	29 (2.6)	24 (2.2)	1,116 (100.0)	76	1,192	1.30	0.31
3.0～ (%)	6 (0.1)	17 (0.2)	64 (0.9)	445 (6.0)	1,559 (21.2)	2,294 (31.1)	1,634 (22.2)	826 (11.2)	316 (4.3)	207 (2.8)	7,368 (100.0)	346	7,714	1.36	0.29
3.5～ (%)	8 (0.0)	14 (0.1)	154 (0.9)	1,076 (6.2)	3,838 (22.0)	5,380 (30.8)	3,938 (22.6)	1,833 (10.5)	709 (4.1)	499 (2.9)	17,449 (100.0)	632	18,081	1.36	0.29
4.0～ (%)	4 (0.1)	4 (0.1)	59 (1.0)	493 (8.1)	1,586 (26.1)	1,851 (30.5)	1,175 (19.3)	544 (9.0)	215 (3.5)	146 (2.4)	6,077 (100.0)	206	6,283	1.32	0.28
4.5～ (%)			5 (1.9)	30 (11.3)	82 (30.8)	77 (28.9)	37 (13.9)	20 (7.5)	12 (4.5)	3 (1.1)	266 (100.0)	9	275	1.27	0.28
5.0～ (%)				1 (7.7)	3 (23.1)	6 (46.2)	2 (15.4)	1 (7.7)			13 (100.0)	2	15	1.30	0.24
合計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,194 (6.7)	7,415 (22.8)	9,997 (30.7)	7,041 (21.6)	3,341 (10.3)	1,286 (3.9)	887 (2.7)	32,561 (100.0)	1,291	33,852	1.35	0.29
記載なし (%)				17 (4.5)	87 (23.2)	142 (37.9)	89 (23.7)	31 (8.3)	6 (1.6)	3 (0.8)	375 (100.0)	744	1,119	1.33	0.23
総計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	2,035	34,971	1.35	0.29
平均	3.45	3.29	3.51	3.65	3.66	3.65	3.63	3.62	3.64	3.62	3.64	3.57	3.64		
標準偏差	0.55	0.55	0.56	0.44	0.40	0.37	0.36	0.36	0.36	0.36	0.38	0.43	0.38		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査