

表 3101 equilibrated Kt/V (eKt/V) PTH値(pg/mL)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上) PTH測定法:intact-PTH

PTH値	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	1 (0.1)	6 (0.4)	15 (1.1)	89 (6.3)	297 (21.0)	394 (27.9)	324 (23.0)	162 (11.5)	73 (5.2)	50 (3.5)	1,411 (100.0)	60	1,471	1.37	0.31
20～ (%)		3 (0.2)	23 (1.3)	111 (6.0)	398 (21.7)	600 (32.7)	388 (21.1)	179 (9.8)	79 (4.3)	54 (2.9)	1,835 (100.0)	72	1,907	1.35	0.29
40～ (%)	2 (0.1)	27 (1.3)	129 (6.3)	454 (22.1)	614 (29.9)	440 (21.4)	235 (11.4)	96 (4.7)	56 (2.7)	2,053 (100.0)	82	2,135	1.36	0.29	
60～ (%)	1 (0.0)	5 (0.2)	23 (1.1)	154 (7.2)	493 (22.9)	678 (31.5)	453 (21.1)	204 (9.5)	79 (3.7)	59 (2.7)	2,149 (100.0)	81	2,230	1.34	0.29
80～ (%)	1 (0.0)	3 (0.1)	22 (0.9)	165 (6.8)	572 (23.5)	757 (31.1)	513 (21.1)	236 (9.7)	98 (4.0)	69 (2.8)	2,436 (100.0)	75	2,511	1.34	0.29
100～ (%)	3 (0.1)	2 (0.1)	27 (1.1)	185 (7.8)	523 (22.0)	709 (29.8)	536 (22.6)	246 (10.4)	80 (3.4)	65 (2.7)	2,376 (100.0)	83	2,459	1.35	0.29
120～ (%)	2 (0.1)	5 (0.2)	22 (1.0)	133 (6.0)	516 (23.3)	694 (31.4)	477 (21.6)	233 (10.5)	82 (3.7)	47 (2.1)	2,211 (100.0)	70	2,281	1.35	0.28
140～ (%)	1 (0.1)	4 (0.2)	19 (1.0)	109 (5.5)	484 (24.6)	620 (31.5)	412 (20.9)	199 (10.1)	78 (4.0)	42 (2.1)	1,968 (100.0)	67	2,035	1.34	0.27
160～ (%)		2 (0.1)	16 (0.9)	142 (7.8)	415 (22.7)	560 (30.6)	417 (22.8)	160 (8.8)	60 (3.3)	56 (3.1)	1,828 (100.0)	64	1,892	1.34	0.29
180～ (%)	3 (0.1)	4 (0.1)	41 (1.0)	312 (7.4)	968 (22.9)	1,337 (31.7)	882 (20.9)	424 (10.0)	175 (4.1)	74 (1.8)	4,220 (100.0)	160	4,380	1.34	0.28
240～ (%)			6 (8.8)	18 (26.5)	20 (29.4)	15 (22.1)	5 (7.4)	3 (4.4)	1 (1.5)	68 (100.0)	2	70	1.32	0.27	
241～ (%)			29 (1.2)	197 (7.9)	575 (23.2)	763 (30.7)	526 (21.2)	247 (9.9)	85 (3.4)	61 (2.5)	2,483 (100.0)	92	2,575	1.33	0.28
300～ (%)	1 (0.1)	3 (0.2)	11 (0.8)	87 (6.1)	355 (24.8)	451 (31.5)	316 (22.1)	120 (8.4)	41 (2.9)	45 (3.1)	1,430 (100.0)	59	1,489	1.34	0.28
360～ (%)	1 (0.1)	1 (0.1)	9 (1.0)	58 (6.5)	209 (23.4)	289 (32.3)	190 (21.2)	84 (9.4)	28 (3.1)	26 (2.9)	895 (100.0)	30	925	1.34	0.28
420～ (%)	1 (0.2)	3 (0.6)	11 (2.2)	28 (5.6)	123 (24.4)	147 (29.2)	117 (23.2)	47 (9.3)	21 (4.2)	6 (1.2)	504 (100.0)	20	524	1.33	0.28
480～ (%)		1 (0.8)	10 (8.1)	32 (25.8)	30 (24.2)	27 (21.8)	13 (10.5)	8 (6.5)	3 (2.4)	3 (100.0)	124 (100.0)	1	125	1.36	0.28
500～ (%)	1 (0.5)	1 (0.5)	10 (5.1)	51 (26.0)	58 (29.6)	39 (19.9)	23 (11.7)	9 (4.6)	4 (2.0)	4 (100.0)	196 (100.0)	8	204	1.34	0.29
540～ (%)		2 (0.9)	15 (6.7)	53 (23.8)	70 (31.4)	44 (19.7)	24 (10.8)	10 (4.5)	5 (2.2)	5 (100.0)	223 (100.0)	9	232	1.34	0.28
600～ (%)		1 (0.3)	2 (0.5)	25 (6.6)	97 (25.6)	119 (31.4)	84 (22.2)	39 (10.3)	8 (2.1)	4 (1.1)	379 (100.0)	12	391	1.32	0.26
800～ (%)		6 (1.9)	28 (8.8)	66 (20.8)	90 (28.4)	74 (23.3)	40 (12.6)	9 (2.8)	4 (1.3)	4 (100.0)	317 (100.0)	17	334	1.33	0.27
合計 (%)	18 (0.1)	42 (0.1)	307 (1.1)	1,993 (6.8)	6,699 (23.0)	9,000 (30.9)	6,274 (21.6)	2,920 (10.0)	1,122 (3.9)	731 (2.5)	29,106 (100.0)	1,064	30,170	1.34	0.28
記載なし (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	6 (1.4)	35 (8.4)	98 (23.4)	123 (29.4)	100 (23.9)	34 (8.1)	16 (3.8)	5 (1.2)	419 (100.0)	157	576	1.32	0.30
総計 (%)	19 (0.1)	43 (0.1)	313 (1.1)	2,028 (6.9)	6,797 (23.0)	9,123 (30.9)	6,374 (21.6)	2,954 (10.0)	1,138 (3.9)	736 (2.5)	29,525 (100.0)	1,221	30,746	1.34	0.28
平均	185.89	159.81	179.05	182.42	182.14	177.67	179.60	178.20	166.38	161.70	178.65	182.77	178.80		
標準偏差	142.95	148.83	173.39	175.69	176.43	163.84	179.60	182.31	156.70	161.80	172.74	198.36	173.71		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査