

表 3107 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析前収縮期血圧(mmHg)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前収縮期血圧	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)						1 (100.0)					1 (100.0)		1	1.37	
60～ (%)		1 (1.0)	4 (3.8)	11 (10.6)	22 (21.2)	30 (28.8)	19 (18.3)	12 (11.5)	2 (1.9)	3 (2.9)	104 (100.0)	6	110	1.31	0.33
80～ (%)		2 (0.4)	4 (0.8)	30 (5.7)	118 (22.5)	153 (29.1)	117 (22.3)	59 (11.2)	22 (4.2)	20 (3.8)	525 (100.0)	36	561	1.37	0.31
100～ (%)	3 (0.1)	5 (0.2)	24 (1.0)	146 (6.2)	503 (21.4)	687 (29.2)	525 (22.3)	263 (11.2)	124 (5.3)	74 (3.1)	2,354 (100.0)	120	2,474	1.37	0.30
120～ (%)	5 (0.1)	9 (0.1)	60 (0.9)	372 (5.8)	1,309 (20.3)	2,026 (31.4)	1,461 (22.7)	727 (11.3)	279 (4.3)	198 (3.1)	6,446 (100.0)	229	6,675	1.37	0.29
140～ (%)	6 (0.1)	12 (0.1)	94 (1.0)	632 (6.5)	2,194 (22.6)	3,036 (31.3)	2,113 (21.8)	987 (10.2)	382 (3.9)	255 (2.6)	9,711 (100.0)	328	10,039	1.35	0.29
160～ (%)	3 (0.0)	7 (0.1)	66 (0.9)	512 (7.2)	1,761 (24.9)	2,197 (31.1)	1,483 (21.0)	656 (9.3)	232 (3.3)	158 (2.2)	7,075 (100.0)	214	7,289	1.33	0.28
180～ (%)	1 (0.0)	3 (0.1)	29 (1.1)	218 (8.2)	685 (25.7)	798 (29.9)	538 (20.2)	246 (9.2)	93 (3.5)	58 (2.2)	2,669 (100.0)	66	2,735	1.32	0.28
200～ (%)		1 (0.1)	8 (1.2)	61 (8.9)	174 (25.3)	210 (30.5)	154 (22.4)	60 (8.7)	15 (2.2)	6 (0.9)	689 (100.0)	17	706	1.30	0.26
220～ (%)			4 (2.2)	20 (11.2)	38 (21.3)	51 (28.7)	38 (21.3)	17 (9.6)	9 (5.1)	1 (0.6)	178 (100.0)	4	182	1.31	0.30
合計 (%)	18 (0.1)	40 (0.1)	293 (1.0)	2,002 (6.7)	6,804 (22.9)	9,189 (30.9)	6,448 (21.7)	3,027 (10.2)	1,158 (3.9)	773 (2.6)	29,752 (100.0)	1,020	30,772	1.35	0.29
記載なし (%)	2 (0.1)	4 (0.1)	43 (1.4)	209 (6.6)	698 (21.9)	950 (29.8)	682 (21.4)	345 (10.8)	134 (4.2)	117 (3.7)	3,184 (100.0)	1,015	4,199	1.36	0.31
総計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	2,035	34,971	1.35	0.29
平均	142.39	143.28	150.72	153.40	152.34	150.68	150.05	148.90	147.44	146.21	150.67	145.73	150.50		
標準偏差	21.89	28.82	27.82	26.10	25.09	24.68	24.81	25.08	24.90	23.88	25.01	26.09	25.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査