

表 3108 equilibrated Kt/V(eKt/V) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前拡張 期血圧	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)					1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)			5 (100.0)	1	6	1.39	0.22
20～ (%)			1 (0.9)	11 (10.3)	29 (27.1)	31 (29.0)	16 (15.0)	9 (8.4)	7 (6.5)	3 (2.8)	107 (100.0)	4	111	1.32	0.30
40～ (%)	2 (0.1)	6 (0.3)	25 (1.1)	129 (5.8)	457 (20.6)	669 (30.1)	536 (24.1)	257 (11.6)	77 (3.5)	63 (2.8)	2,221 (100.0)	115	2,336	1.36	0.29
60～ (%)	10 (0.1)	12 (0.1)	117 (0.9)	801 (6.4)	2,748 (21.8)	3,945 (31.4)	2,761 (21.9)	1,341 (10.7)	494 (3.9)	353 (2.8)	12,582 (100.0)	479	13,061	1.35	0.29
80～ (%)	2 (0.0)	13 (0.2)	78 (1.0)	526 (6.8)	1,753 (22.7)	2,400 (31.1)	1,677 (21.8)	739 (9.6)	324 (4.2)	195 (2.5)	7,707 (100.0)	230	7,937	1.35	0.29
90～ (%)	3 (0.1)	3 (0.1)	46 (1.0)	329 (7.2)	1,110 (24.4)	1,374 (30.2)	948 (20.9)	456 (10.0)	173 (3.8)	104 (2.3)	4,546 (100.0)	125	4,671	1.33	0.28
100～ (%)	1 (0.0)	3 (0.1)	23 (1.0)	182 (7.9)	646 (28.0)	687 (29.7)	446 (19.3)	198 (8.6)	75 (3.2)	50 (2.2)	2,311 (100.0)	63	2,374	1.31	0.28
120～ (%)				18 (12.2)	32 (21.8)	45 (30.6)	31 (21.1)	13 (8.8)	5 (3.4)	3 (2.0)	147 (100.0)	2	149	1.33	0.30
140～ (%)				1 (11.1)	3 (33.3)	2 (22.2)	1 (11.1)	1 (11.1)	1 (11.1)		9 (100.0)		9	1.34	0.29
合計 (%)	18 (0.1)	37 (0.1)	290 (1.0)	1,997 (6.7)	6,779 (22.9)	9,155 (30.9)	6,417 (21.7)	3,015 (10.2)	1,156 (3.9)	771 (2.6)	29,635 (100.0)	1,019	30,654	1.35	0.29
記載なし (%)	2 (0.1)	7 (0.2)	46 (1.4)	214 (6.5)	723 (21.9)	984 (29.8)	713 (21.6)	357 (10.8)	136 (4.1)	119 (3.6)	3,301 (100.0)	1,016	4,317	1.36	0.31
総計 (%)	20 (0.1)	44 (0.1)	336 (1.0)	2,211 (6.7)	7,502 (22.8)	10,139 (30.8)	7,130 (21.6)	3,372 (10.2)	1,292 (3.9)	890 (2.7)	32,936 (100.0)	2,035	34,971	1.35	0.29
平均	73.50	77.05	78.82	80.42	80.35	79.15	78.74	78.46	78.99	78.01	79.31	76.10	79.20		
標準偏差	15.68	16.23	14.78	15.37	14.90	14.48	14.51	14.55	14.43	14.32	14.67	15.21	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査