

表 3110 nPCR(g/kg/day) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	238	5,455	34,133	44,975	16,102	2,428	272	34	14	28	103,679	8,836	112,515	0.85	0.17
(%)	(0.2)	(5.3)	(32.9)	(43.4)	(15.5)	(2.3)	(0.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
女性	131	2,963	16,823	25,536	12,146	2,488	283	45	11	10	60,436	5,258	65,694	0.88	0.18
(%)	(0.2)	(4.9)	(27.8)	(42.3)	(20.1)	(4.1)	(0.5)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
合計	369	8,418	50,956	70,511	28,248	4,916	555	79	25	38	164,115	14,094	178,209	0.86	0.18
(%)	(0.2)	(5.1)	(31.0)	(43.0)	(17.2)	(3.0)	(0.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	369	8,418	50,956	70,511	28,248	4,916	555	79	25	38	164,115	14,094	178,209	0.86	0.18
(%)	(0.2)	(5.1)	(31.0)	(43.0)	(17.2)	(3.0)	(0.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査