

表 3111 nPCR(g/kg/day) 年齢(歳)別(施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

| 年齢           | 0.4未満        | 0.4～           | 0.6～             | 0.8～             | 1.0～             | 1.2～           | 1.4～         | 1.6～        | 1.8～        | 2.0～        | 合計                 | 記載なし   | 総計      | 平均   | 標準偏差 |
|--------------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------|---------|------|------|
| 15歳未満<br>(%) |              | 2<br>(40.0)    | 1<br>(20.0)      | 1<br>(20.0)      | 1<br>(20.0)      |                |              |             |             |             | 5<br>(100.0)       | 1      | 6       | 0.78 | 0.21 |
| 15歳～<br>(%)  |              | 6<br>(1.5)     | 73<br>(18.0)     | 168<br>(41.5)    | 119<br>(29.4)    | 30<br>(7.4)    | 6<br>(1.5)   |             | 1<br>(0.2)  | 2<br>(0.5)  | 405<br>(100.0)     | 36     | 441     | 0.96 | 0.21 |
| 30歳～<br>(%)  | 13<br>(0.2)  | 183<br>(2.6)   | 1,469<br>(21.2)  | 3,093<br>(44.7)  | 1,714<br>(24.8)  | 378<br>(5.5)   | 64<br>(0.9)  | 3<br>(0.0)  | 2<br>(0.0)  |             | 6,919<br>(100.0)   | 561    | 7,480   | 0.92 | 0.18 |
| 45歳～<br>(%)  | 53<br>(0.2)  | 964<br>(3.3)   | 7,729<br>(26.6)  | 13,037<br>(44.8) | 6,022<br>(20.7)  | 1,097<br>(3.8) | 147<br>(0.5) | 23<br>(0.1) | 3<br>(0.0)  | 3<br>(0.0)  | 29,078<br>(100.0)  | 2,360  | 31,438  | 0.89 | 0.17 |
| 60歳～<br>(%)  | 158<br>(0.2) | 3,488<br>(4.5) | 22,918<br>(29.8) | 33,794<br>(43.9) | 13,861<br>(18.0) | 2,457<br>(3.2) | 247<br>(0.3) | 31<br>(0.0) | 8<br>(0.0)  | 22<br>(0.0) | 76,984<br>(100.0)  | 6,599  | 83,583  | 0.87 | 0.17 |
| 75歳～<br>(%)  | 135<br>(0.3) | 3,504<br>(7.3) | 17,679<br>(36.9) | 19,355<br>(40.4) | 6,236<br>(13.0)  | 915<br>(1.9)   | 89<br>(0.2)  | 21<br>(0.0) | 11<br>(0.0) | 11<br>(0.0) | 47,956<br>(100.0)  | 4,256  | 52,212  | 0.83 | 0.17 |
| 90歳～<br>(%)  | 10<br>(0.4)  | 271<br>(9.8)   | 1,087<br>(39.3)  | 1,063<br>(38.4)  | 295<br>(10.7)    | 39<br>(1.4)    | 2<br>(0.1)   | 1<br>(0.0)  |             |             | 2,768<br>(100.0)   | 277    | 3,045   | 0.80 | 0.17 |
| 合計<br>(%)    | 369<br>(0.2) | 8,418<br>(5.1) | 50,956<br>(31.0) | 70,511<br>(43.0) | 28,248<br>(17.2) | 4,916<br>(3.0) | 555<br>(0.3) | 79<br>(0.0) | 25<br>(0.0) | 38<br>(0.0) | 164,115<br>(100.0) | 14,090 | 178,205 | 0.86 | 0.18 |
| 不明<br>(%)    |              |                |                  |                  |                  |                |              |             |             |             |                    | 4      | 4       |      |      |
| 記載なし<br>(%)  |              |                |                  |                  |                  |                |              |             |             |             |                    |        |         |      |      |
| 総計<br>(%)    | 369<br>(0.2) | 8,418<br>(5.1) | 50,956<br>(31.0) | 70,511<br>(43.0) | 28,248<br>(17.2) | 4,916<br>(3.0) | 555<br>(0.3) | 79<br>(0.0) | 25<br>(0.0) | 38<br>(0.0) | 164,115<br>(100.0) | 14,094 | 178,209 | 0.86 | 0.18 |
| 平均           | 70.01        | 71.71          | 69.60            | 67.33            | 65.36            | 64.12          | 61.62        | 66.47       | 67.08       | 66.82       | 67.81              | 68.27  | 67.85   |      |      |
| 標準偏差         | 12.15        | 11.52          | 11.75            | 12.07            | 12.34            | 12.53          | 13.37        | 13.33       | 16.22       | 13.77       | 12.15              | 12.14  | 12.15   |      |      |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査