

表 3112 nPCR(g/kg/day) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	152 (0.3)	3,332 (6.2)	19,035 (35.4)	22,343 (41.6)	7,601 (14.1)	1,124 (2.1)	129 (0.2)	22 (0.0)	13 (0.0)	10 (0.0)	53,761 (100.0)	4,528	58,289	0.84	0.17
5年～ (%)	118 (0.2)	2,908 (5.3)	17,250 (31.6)	23,558 (43.1)	9,042 (16.5)	1,563 (2.9)	164 (0.3)	26 (0.0)	8 (0.0)	14 (0.0)	54,651 (100.0)	4,576	59,227	0.86	0.17
10年～ (%)	57 (0.2)	1,208 (4.4)	7,785 (28.1)	12,132 (43.9)	5,408 (19.5)	948 (3.4)	113 (0.4)	11 (0.0)	1 (0.0)	4 (0.0)	27,667 (100.0)	2,365	30,032	0.88	0.17
15年～ (%)	21 (0.1)	525 (3.7)	3,531 (25.2)	6,181 (44.1)	3,041 (21.7)	623 (4.4)	69 (0.5)	10 (0.1)	1 (0.0)	6 (0.0)	14,008 (100.0)	1,241	15,249	0.89	0.18
20年～ (%)	10 (0.1)	222 (3.1)	1,679 (23.2)	3,307 (45.7)	1,626 (22.5)	325 (4.5)	53 (0.7)	5 (0.1)		3 (0.0)	7,230 (100.0)	701	7,931	0.90	0.18
25年～ (%)	5 (0.1)	113 (3.1)	888 (24.2)	1,610 (43.8)	843 (23.0)	197 (5.4)	12 (0.3)	2 (0.1)	2 (0.1)	1 (0.0)	3,673 (100.0)	371	4,044	0.91	0.18
30年～ (%)	3 (0.1)	67 (3.3)	484 (24.1)	907 (45.1)	441 (21.9)	96 (4.8)	10 (0.5)	2 (0.1)			2,010 (100.0)	173	2,183	0.90	0.18
35年～ (%)	1 (0.1)	32 (3.5)	240 (26.2)	390 (42.6)	212 (23.2)	35 (3.8)	4 (0.4)	1 (0.1)			915 (100.0)	118	1,033	0.89	0.18
40年～ (%)	2 (1.0)	11 (5.5)	64 (32.0)	83 (41.5)	34 (17.0)	5 (2.5)	1 (0.5)				200 (100.0)	21	221	0.85	0.18
合計 (%)	369 (0.2)	8,418 (5.1)	50,956 (31.0)	70,511 (43.0)	28,248 (17.2)	4,916 (3.0)	555 (0.3)	79 (0.0)	25 (0.0)	38 (0.0)	164,115 (100.0)	14,094	178,209	0.86	0.18
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	369 (0.2)	8,418 (5.1)	50,956 (31.0)	70,511 (43.0)	28,248 (17.2)	4,916 (3.0)	555 (0.3)	79 (0.0)	25 (0.0)	38 (0.0)	164,115 (100.0)	14,094	178,209	0.86	0.18
平均	7.59	7.55	7.99	8.95	9.90	10.67	10.74	10.19	7.40	9.53	8.80	9.12	8.83		
標準偏差	6.56	6.12	6.48	6.95	7.35	7.61	7.51	8.02	6.90	6.66	6.91	7.24	6.94		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査