

表 3115 nPCR(g/kg/day) 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				1 (10.0)	2 (20.0)	1 (10.0)		1 (10.0)	1 (10.0)	4 (40.0)	10 (100.0)	52	62	1.72	0.63
20～ (%)	5 (0.8)	51 (8.5)	183 (30.4)	226 (37.6)	88 (14.6)	33 (5.5)	10 (1.7)	1 (0.2)		4 (0.7)	601 (100.0)	55	656	0.87	0.25
30～ (%)	66 (0.5)	989 (6.9)	4,023 (28.0)	5,577 (38.8)	2,877 (20.0)	720 (5.0)	82 (0.6)	22 (0.2)	7 (0.0)	8 (0.1)	14,371 (100.0)	1,001	15,372	0.87	0.20
40～ (%)	110 (0.2)	2,623 (5.9)	13,273 (29.6)	18,370 (41.0)	8,560 (19.1)	1,625 (3.6)	187 (0.4)	20 (0.0)	7 (0.0)	4 (0.0)	44,779 (100.0)	2,754	47,533	0.87	0.18
50～ (%)	118 (0.2)	2,633 (5.0)	16,711 (31.5)	23,090 (43.5)	8,837 (16.7)	1,492 (2.8)	150 (0.3)	24 (0.0)	5 (0.0)	6 (0.0)	53,066 (100.0)	3,040	56,106	0.86	0.17
60～ (%)	45 (0.1)	1,374 (4.3)	10,489 (32.5)	14,545 (45.0)	5,084 (15.7)	686 (2.1)	77 (0.2)	5 (0.0)	2 (0.0)	4 (0.0)	32,311 (100.0)	1,655	33,966	0.85	0.16
70～ (%)	20 (0.2)	500 (4.0)	4,172 (33.7)	5,623 (45.5)	1,789 (14.5)	221 (1.8)	33 (0.3)	4 (0.0)	1 (0.0)	2 (0.0)	12,365 (100.0)	676	13,041	0.85	0.16
80～ (%)	1 (0.0)	164 (3.9)	1,340 (31.7)	1,954 (46.3)	674 (16.0)	74 (1.8)	9 (0.2)	2 (0.0)	1 (0.0)	5 (0.1)	4,224 (100.0)	227	4,451	0.86	0.17
90～ (%)	3 (0.2)	55 (3.6)	487 (31.6)	734 (47.6)	217 (14.1)	39 (2.5)	4 (0.3)		1 (0.1)	1 (0.1)	1,541 (100.0)	74	1,615	0.86	0.17
100～ (%)	1 (0.2)	20 (3.9)	169 (33.1)	229 (44.8)	80 (15.7)	11 (2.2)	1 (0.2)				511 (100.0)	29	540	0.85	0.16
110～ (%)		5 (2.5)	59 (29.4)	100 (49.8)	26 (12.9)	10 (5.0)	1 (0.5)				201 (100.0)	14	215	0.88	0.17
120～ (%)		4 (3.0)	50 (37.0)	62 (45.9)	14 (10.4)	4 (3.0)	1 (0.7)				135 (100.0)	3	138	0.85	0.16
合計 (%)	369 (0.2)	8,418 (5.1)	50,956 (31.0)	70,511 (43.0)	28,248 (17.2)	4,916 (3.0)	555 (0.3)	79 (0.0)	25 (0.0)	38 (0.0)	164,115 (100.0)	9,580	173,695	0.86	0.18
記載なし (%)												4,514	4,514		
総計 (%)	369 (0.2)	8,418 (5.1)	50,956 (31.0)	70,511 (43.0)	28,248 (17.2)	4,916 (3.0)	555 (0.3)	79 (0.0)	25 (0.0)	38 (0.0)	164,115 (100.0)	14,094	178,209	0.86	0.18
平均	50.98	53.13	55.82	55.85	54.08	51.88	51.52	48.44	49.48	48.59	55.25	53.93	55.17		
標準偏差	11.85	12.32	12.77	12.80	12.48	12.47	13.37	12.88	15.90	21.92	12.75	13.13	12.78		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査