

表 3116 nPCR(g/kg/day) 透析後体重(kg)別（施設血液透析患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				1 (14.3)	1 (14.3)				1 (14.3)	4 (57.1)	7 (100.0)	26	33	1.87	0.69
20～ (%)		1 (4.2)	4 (16.7)	8 (33.3)	5 (20.8)	2 (8.3)	1 (4.2)			3 (12.5)	24 (100.0)	3	27	1.15	0.57
30～ (%)	16 (0.8)	196 (9.9)	643 (32.6)	703 (35.7)	310 (15.7)	85 (4.3)	9 (0.5)		3 (0.2)	6 (0.3)	1,971 (100.0)	168	2,139	0.84	0.22
40～ (%)	64 (0.3)	1,425 (7.6)	6,384 (33.9)	7,416 (39.3)	2,986 (15.8)	507 (2.7)	56 (0.3)	6 (0.0)	2 (0.0)	1 (0.0)	18,847 (100.0)	1,258	20,105	0.84	0.18
50～ (%)	94 (0.2)	2,022 (5.2)	12,525 (32.4)	16,751 (43.3)	6,135 (15.9)	979 (2.5)	106 (0.3)	21 (0.1)	5 (0.0)	6 (0.0)	38,644 (100.0)	2,255	40,899	0.85	0.17
60～ (%)	41 (0.1)	1,172 (4.3)	9,014 (32.9)	12,308 (45.0)	4,218 (15.4)	549 (2.0)	60 (0.2)	4 (0.0)	2 (0.0)	2 (0.0)	27,370 (100.0)	1,402	28,772	0.85	0.16
70～ (%)	18 (0.2)	421 (3.9)	3,687 (33.9)	4,995 (45.9)	1,546 (14.2)	184 (1.7)	25 (0.2)	3 (0.0)		1 (0.0)	10,880 (100.0)	604	11,484	0.85	0.16
80～ (%)	1 (0.0)	144 (3.8)	1,182 (31.4)	1,759 (46.8)	594 (15.8)	67 (1.8)	8 (0.2)		1 (0.0)	4 (0.1)	3,760 (100.0)	190	3,950	0.86	0.16
90～ (%)	3 (0.2)	48 (3.5)	438 (31.5)	667 (48.0)	195 (14.0)	33 (2.4)	4 (0.3)			1 (0.1)	1,389 (100.0)	66	1,455	0.86	0.17
100～ (%)	1 (0.2)	17 (3.6)	158 (33.1)	215 (45.1)	75 (15.7)	10 (2.1)	1 (0.2)				477 (100.0)	29	506	0.85	0.16
110～ (%)		5 (2.7)	54 (29.3)	92 (50.0)	24 (13.0)	8 (4.3)	1 (0.5)				184 (100.0)	14	198	0.88	0.17
120～ (%)		4 (3.2)	44 (34.9)	60 (47.6)	13 (10.3)	4 (3.2)	1 (0.8)				126 (100.0)	3	129	0.85	0.16
合計 (%)	238 (0.2)	5,455 (5.3)	34,133 (32.9)	44,975 (43.4)	16,102 (15.5)	2,428 (2.3)	272 (0.3)	34 (0.0)	14 (0.0)	28 (0.0)	103,679 (100.0)	6,018	109,697	0.85	0.17
記載なし (%)												2,818	2,818		
総計 (%)	238 (0.2)	5,455 (5.3)	34,133 (32.9)	44,975 (43.4)	16,102 (15.5)	2,428 (2.3)	272 (0.3)	34 (0.0)	14 (0.0)	28 (0.0)	103,679 (100.0)	8,836	112,515	0.85	0.17
平均	55.03	56.70	59.47	60.12	59.19	57.85	57.89	55.66	50.14	47.63	59.51	58.18	59.43		
標準偏差	11.13	11.60	12.02	12.05	11.81	12.26	13.44	7.95	15.97	23.06	12.02	12.45	12.05		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査