

表 3121 nPCR(g/kg/day) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前アルブミン 濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)	8 (14.0)	22 (38.6)	15 (26.3)	9 (15.8)	3 (5.3)						57 (100.0)	16	73	0.61	0.21
1.5～ (%)	30 (8.1)	137 (36.8)	131 (35.2)	53 (14.2)	19 (5.1)	1 (0.3)	1 (0.3)				372 (100.0)	102	474	0.64	0.19
2.0～ (%)	74 (4.2)	587 (32.9)	693 (38.9)	308 (17.3)	91 (5.1)	21 (1.2)	3 (0.2)	4 (0.2)	1 (0.1)		1,782 (100.0)	312	2,094	0.68	0.20
2.5～ (%)	92 (1.2)	1,535 (19.5)	3,344 (42.6)	2,132 (27.1)	588 (7.5)	140 (1.8)	18 (0.2)	4 (0.1)		1 (0.0)	7,854 (100.0)	842	8,696	0.75	0.19
3.0～ (%)	73 (0.2)	2,837 (7.5)	14,275 (37.9)	14,715 (39.0)	4,848 (12.9)	822 (2.2)	84 (0.2)	17 (0.0)	4 (0.0)	11 (0.0)	37,686 (100.0)	2,320	40,006	0.82	0.17
3.5～ (%)	61 (0.1)	2,568 (3.2)	23,614 (29.3)	36,609 (45.4)	14,969 (18.6)	2,528 (3.1)	267 (0.3)	34 (0.0)	14 (0.0)	15 (0.0)	80,679 (100.0)	4,215	84,894	0.88	0.17
4.0～ (%)	23 (0.1)	552 (1.8)	7,519 (24.5)	14,517 (47.3)	6,679 (21.8)	1,198 (3.9)	153 (0.5)	17 (0.1)	5 (0.0)	9 (0.0)	30,672 (100.0)	1,446	32,118	0.90	0.17
4.5～ (%)	1 (0.1)	32 (1.8)	394 (22.4)	802 (45.6)	434 (24.7)	81 (4.6)	14 (0.8)			1 (0.1)	1,759 (100.0)	88	1,847	0.91	0.17
5.0～ (%)	2 (1.7)	4 (3.4)	35 (29.4)	51 (42.9)	24 (20.2)	3 (2.5)					119 (100.0)	3	122	0.87	0.18
合計 (%)	364 (0.2)	8,274 (5.1)	50,020 (31.1)	69,196 (43.0)	27,655 (17.2)	4,794 (3.0)	540 (0.3)	76 (0.0)	24 (0.0)	37 (0.0)	160,980 (100.0)	9,344	170,324	0.86	0.18
記載なし (%)	5 (0.2)	144 (4.6)	936 (29.9)	1,315 (41.9)	593 (18.9)	122 (3.9)	15 (0.5)	3 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	3,135 (100.0)	4,750	7,885	0.87	0.18
総計 (%)	369 (0.2)	8,418 (5.1)	50,956 (31.0)	70,511 (43.0)	28,248 (17.2)	4,916 (3.0)	555 (0.3)	79 (0.0)	25 (0.0)	38 (0.0)	164,115 (100.0)	14,094	178,209	0.86	0.18
平均	2.85	3.23	3.55	3.67	3.72	3.72	3.75	3.57	3.63	3.62	3.62	3.50	3.61		
標準偏差	0.74	0.55	0.43	0.38	0.37	0.38	0.40	0.49	0.46	0.41	0.42	0.52	0.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査