

表 3123 nPCR(g/kg/day) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前補正 カルシウム濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		18 (3.2)	145 (26.0)	237 (42.5)	117 (21.0)	32 (5.7)	8 (1.4)				557 (100.0)	51	608	0.90	0.19
7.0～ (%)		17 (2.1)	193 (24.1)	356 (44.5)	191 (23.9)	35 (4.4)	6 (0.8)	2 (0.3)			800 (100.0)	42	842	0.91	0.18
7.5～ (%)	3 (0.1)	70 (2.2)	846 (26.7)	1,411 (44.5)	652 (20.6)	168 (5.3)	21 (0.7)	1 (0.0)			3,172 (100.0)	173	3,345	0.90	0.18
8.0～ (%)	16 (0.2)	349 (3.3)	2,987 (28.5)	4,648 (44.4)	2,012 (19.2)	414 (4.0)	41 (0.4)	5 (0.0)		3 (0.0)	10,475 (100.0)	547	11,022	0.88	0.17
8.4～ (%)	4 (0.1)	106 (3.5)	904 (29.9)	1,316 (43.6)	565 (18.7)	107 (3.5)	16 (0.5)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	3,021 (100.0)	150	3,171	0.88	0.17
8.5～ (%)	53 (0.1)	1,598 (4.3)	11,450 (31.0)	16,019 (43.4)	6,521 (17.7)	1,103 (3.0)	138 (0.4)	18 (0.0)	8 (0.0)	9 (0.0)	36,917 (100.0)	1,946	38,863	0.87	0.17
9.0～ (%)	91 (0.2)	2,401 (4.9)	15,378 (31.6)	21,039 (43.2)	8,260 (17.0)	1,346 (2.8)	135 (0.3)	16 (0.0)	8 (0.0)	8 (0.0)	48,682 (100.0)	2,653	51,335	0.86	0.17
9.5～ (%)	77 (0.2)	1,849 (5.5)	10,508 (31.0)	14,685 (43.3)	5,687 (16.8)	954 (2.8)	97 (0.3)	12 (0.0)		10 (0.0)	33,879 (100.0)	2,013	35,892	0.86	0.17
10.0～ (%)	10 (0.2)	269 (6.3)	1,374 (32.1)	1,761 (41.1)	708 (16.5)	139 (3.2)	16 (0.4)	3 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)	4,283 (100.0)	253	4,536	0.85	0.18
10.1～ (%)	48 (0.4)	751 (6.8)	3,467 (31.6)	4,560 (41.5)	1,813 (16.5)	290 (2.6)	33 (0.3)	11 (0.1)	2 (0.0)	3 (0.0)	10,978 (100.0)	703	11,681	0.85	0.18
10.5～ (%)	26 (0.5)	454 (8.5)	1,792 (33.7)	2,114 (39.8)	763 (14.4)	142 (2.7)	19 (0.4)	3 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	5,315 (100.0)	397	5,712	0.83	0.19
11.0～ (%)	15 (0.9)	207 (11.9)	579 (33.2)	645 (37.0)	244 (14.0)	41 (2.4)	7 (0.4)	2 (0.1)	2 (0.1)		1,742 (100.0)	149	1,891	0.82	0.20
11.5～ (%)	8 (1.3)	86 (13.9)	210 (34.0)	232 (37.6)	64 (10.4)	12 (1.9)	2 (0.3)	2 (0.3)		1 (0.2)	617 (100.0)	61	678	0.80	0.21
12.0～ (%)	11 (2.8)	87 (21.8)	132 (33.0)	121 (30.3)	41 (10.3)	8 (2.0)					400 (100.0)	46	446	0.76	0.21
合計 (%)	362 (0.2)	8,262 (5.1)	49,965 (31.1)	69,144 (43.0)	27,638 (17.2)	4,791 (3.0)	539 (0.3)	76 (0.0)	24 (0.0)	37 (0.0)	160,838 (100.0)	9,184	170,022	0.86	0.18
記載なし (%)	7 (0.2)	156 (4.8)	991 (30.2)	1,367 (41.7)	610 (18.6)	125 (3.8)	16 (0.5)	3 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	3,277 (100.0)	4,910	8,187	0.87	0.18
総計 (%)	369 (0.2)	8,418 (5.1)	50,956 (31.0)	70,511 (43.0)	28,248 (17.2)	4,916 (3.0)	555 (0.3)	79 (0.0)	25 (0.0)	38 (0.0)	164,115 (100.0)	14,094	178,209	0.86	0.18
平均	9.68	9.46	9.26	9.22	9.19	9.15	9.12	9.36	9.36	9.33	9.24	9.31	9.24		
標準偏差	0.97	0.82	0.73	0.72	0.73	0.76	0.81	0.91	0.79	0.76	0.74	0.80	0.74		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査