

表 3134 nPCR(g/kg/day) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	20	728	6,079	9,505	3,613	569	48	5		3	20,570	1,206	21,776	0.87	0.16
(%)	(0.1)	(3.5)	(29.6)	(46.2)	(17.6)	(2.8)	(0.2)	(0.0)		(0.0)	(100.0)				
女性	23	402	2,994	5,375	2,918	598	80	8	1	3	12,402	793	13,195	0.90	0.18
(%)	(0.2)	(3.2)	(24.1)	(43.3)	(23.5)	(4.8)	(0.6)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
合計	43	1,130	9,073	14,880	6,531	1,167	128	13	1	6	32,972	1,999	34,971	0.88	0.17
(%)	(0.1)	(3.4)	(27.5)	(45.1)	(19.8)	(3.5)	(0.4)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	43	1,130	9,073	14,880	6,531	1,167	128	13	1	6	32,972	1,999	34,971	0.88	0.17
(%)	(0.1)	(3.4)	(27.5)	(45.1)	(19.8)	(3.5)	(0.4)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査