

表 3136 nPCR(g/kg/day) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	11 (0.1)	402 (5.0)	2,653 (32.8)	3,549 (43.9)	1,218 (15.1)	226 (2.8)	25 (0.3)	2 (0.0)			8,086 (100.0)	529	8,615	0.85	0.17
5年～ (%)	15 (0.2)	345 (3.6)	2,803 (29.5)	4,252 (44.8)	1,767 (18.6)	286 (3.0)	24 (0.3)	2 (0.0)			9,494 (100.0)	622	10,116	0.87	0.17
10年～ (%)	9 (0.2)	190 (3.2)	1,489 (25.5)	2,674 (45.7)	1,225 (20.9)	229 (3.9)	27 (0.5)	4 (0.1)		1 (0.0)	5,848 (100.0)	346	6,194	0.89	0.17
15年～ (%)	1 (0.0)	88 (2.4)	839 (22.4)	1,740 (46.5)	882 (23.6)	164 (4.4)	20 (0.5)	3 (0.1)		2 (0.1)	3,739 (100.0)	185	3,924	0.91	0.17
20年～ (%)	1 (0.0)	40 (1.6)	536 (21.4)	1,152 (45.9)	659 (26.3)	108 (4.3)	12 (0.5)			1 (0.0)	2,509 (100.0)	128	2,637	0.92	0.17
25年～ (%)	2 (0.1)	31 (2.0)	338 (21.6)	728 (46.5)	369 (23.6)	87 (5.6)	7 (0.4)			2 (0.1)	1,564 (100.0)	87	1,651	0.92	0.18
30年～ (%)	1 (0.1)	21 (2.0)	239 (22.6)	472 (44.6)	272 (25.7)	44 (4.2)	7 (0.7)	2 (0.2)	1 (0.1)		1,059 (100.0)	64	1,123	0.92	0.17
35年～ (%)	1 (0.2)	12 (2.2)	143 (25.7)	256 (46.0)	118 (21.2)	20 (3.6)	6 (1.1)				556 (100.0)	31	587	0.89	0.17
40年～ (%)	2 (1.7)	1 (0.9)	33 (28.2)	57 (48.7)	21 (17.9)	3 (2.6)					117 (100.0)	7	124	0.88	0.16
合計 (%)	43 (0.1)	1,130 (3.4)	9,073 (27.5)	14,880 (45.1)	6,531 (19.8)	1,167 (3.5)	128 (0.4)	13 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	32,972 (100.0)	1,999	34,971	0.88	0.17
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	43 (0.1)	1,130 (3.4)	9,073 (27.5)	14,880 (45.1)	6,531 (19.8)	1,167 (3.5)	128 (0.4)	13 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	32,972 (100.0)	1,999	34,971	0.88	0.17
平均	11.16	8.87	10.27	11.54	12.74	12.96	13.87	14.23	31.00	20.17	11.40	10.79	11.36		
標準偏差	10.37	7.45	8.38	8.71	8.87	8.84	9.63	9.12		5.42	8.69	8.58	8.68		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査