

表 3139 nPCR(g/kg/day) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)										1 (100.0)	1 (100.0)	10	11	2.85	
20～ (%)		4 (7.0)	11 (19.3)	22 (38.6)	13 (22.8)	4 (7.0)	1 (1.8)			2 (3.5)	57 (100.0)	10	67	0.97	0.40
30～ (%)	4 (0.2)	83 (3.6)	562 (24.6)	927 (40.6)	562 (24.6)	123 (5.4)	21 (0.9)	3 (0.1)			2,285 (100.0)	111	2,396	0.91	0.19
40～ (%)	15 (0.2)	320 (3.7)	2,129 (24.7)	3,737 (43.4)	1,950 (22.7)	404 (4.7)	45 (0.5)	3 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	8,605 (100.0)	348	8,953	0.90	0.18
50～ (%)	12 (0.1)	351 (3.3)	2,892 (27.2)	4,878 (45.9)	2,089 (19.7)	362 (3.4)	40 (0.4)	3 (0.0)			10,627 (100.0)	381	11,008	0.88	0.17
60～ (%)	10 (0.1)	207 (3.0)	2,075 (29.7)	3,257 (46.6)	1,236 (17.7)	181 (2.6)	18 (0.3)	2 (0.0)		1 (0.0)	6,987 (100.0)	244	7,231	0.87	0.16
70～ (%)		104 (3.7)	878 (31.1)	1,318 (46.7)	454 (16.1)	65 (2.3)	3 (0.1)	1 (0.0)			2,823 (100.0)	87	2,910	0.86	0.16
80～ (%)	1 (0.1)	35 (3.4)	353 (33.8)	483 (46.3)	149 (14.3)	20 (1.9)		1 (0.1)		1 (0.1)	1,043 (100.0)	30	1,073	0.85	0.16
90～ (%)	1 (0.3)	20 (5.5)	114 (31.4)	171 (47.1)	52 (14.3)	5 (1.4)					363 (100.0)	8	371	0.84	0.16
100～ (%)		6 (5.7)	33 (31.4)	51 (48.6)	13 (12.4)	2 (1.9)					105 (100.0)	4	109	0.83	0.15
110～ (%)			16 (35.6)	22 (48.9)	6 (13.3)	1 (2.2)					45 (100.0)	1	46	0.85	0.13
120～ (%)			10 (32.3)	14 (45.2)	7 (22.6)						31 (100.0)		31	0.86	0.12
合計 (%)	43 (0.1)	1,130 (3.4)	9,073 (27.5)	14,880 (45.1)	6,531 (19.8)	1,167 (3.5)	128 (0.4)	13 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	32,972 (100.0)	1,234	34,206	0.88	0.17
記載なし (%)												765	765		
総計 (%)	43 (0.1)	1,130 (3.4)	9,073 (27.5)	14,880 (45.1)	6,531 (19.8)	1,167 (3.5)	128 (0.4)	13 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	32,972 (100.0)	1,999	34,971	0.88	0.17
平均	52.68	56.17	57.56	56.90	54.70	52.64	50.04	52.03	46.10	41.10	56.43	54.19	56.35		
標準偏差	12.04	13.41	13.15	12.84	12.32	11.70	10.01	15.32		25.84	12.87	13.15	12.88		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査