

表 3140 nPCR(g/kg/day) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)										1 (100.0)	1 (100.0)	7	8	2.85	
20～ (%)		1 (16.7)	1 (16.7)	2 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)					6 (100.0)		6	0.93	0.31
30～ (%)		12 (4.9)	69 (28.3)	105 (43.0)	51 (20.9)	6 (2.5)	1 (0.4)				244 (100.0)	10	254	0.87	0.18
40～ (%)	4 (0.1)	146 (4.9)	886 (29.5)	1,309 (43.6)	550 (18.3)	103 (3.4)	4 (0.1)				3,002 (100.0)	131	3,133	0.87	0.17
50～ (%)	6 (0.1)	260 (3.5)	2,093 (28.2)	3,417 (46.0)	1,398 (18.8)	229 (3.1)	28 (0.4)	1 (0.0)			7,432 (100.0)	251	7,683	0.88	0.17
60～ (%)	8 (0.1)	168 (2.8)	1,770 (29.8)	2,816 (47.4)	1,009 (17.0)	149 (2.5)	13 (0.2)	2 (0.0)		1 (0.0)	5,936 (100.0)	201	6,137	0.87	0.16
70～ (%)		90 (3.6)	788 (31.4)	1,176 (46.8)	399 (15.9)	55 (2.2)	2 (0.1)	1 (0.0)			2,511 (100.0)	81	2,592	0.86	0.15
80～ (%)	1 (0.1)	28 (3.0)	306 (33.2)	435 (47.2)	132 (14.3)	18 (2.0)		1 (0.1)		1 (0.1)	922 (100.0)	25	947	0.85	0.16
90～ (%)	1 (0.3)	17 (5.0)	109 (31.9)	163 (47.7)	47 (13.7)	5 (1.5)					342 (100.0)	8	350	0.84	0.16
100～ (%)		6 (5.9)	32 (31.4)	49 (48.0)	13 (12.7)	2 (2.0)					102 (100.0)	4	106	0.83	0.15
110～ (%)			15 (36.6)	19 (46.3)	6 (14.6)	1 (2.4)					41 (100.0)	1	42	0.86	0.13
120～ (%)			10 (32.3)	14 (45.2)	7 (22.6)						31 (100.0)		31	0.86	0.12
合計 (%)	20 (0.1)	728 (3.5)	6,079 (29.6)	9,505 (46.2)	3,613 (17.6)	569 (2.8)	48 (0.2)	5 (0.0)		3 (0.0)	20,570 (100.0)	719	21,289	0.87	0.16
記載なし (%)												487	487		
総計 (%)	20 (0.1)	728 (3.5)	6,079 (29.6)	9,505 (46.2)	3,613 (17.6)	569 (2.8)	48 (0.2)	5 (0.0)		3 (0.0)	20,570 (100.0)	1,206	21,776	0.87	0.16
平均	59.70	59.94	61.49	61.39	60.17	58.91	57.23	67.04		53.97	61.07	59.14	61.01		
標準偏差	11.94	12.79	12.44	12.13	11.71	11.18	7.78	12.75		32.10	12.16	12.75	12.19		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査