

表 3141 nPCR(g/kg/day) 透析後体重(kg)別（血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析後体重	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)												3	3		
20～ (%)		3 (5.9)	10 (19.6)	20 (39.2)	12 (23.5)	3 (5.9)	1 (2.0)			2 (3.9)	51 (100.0)	10	61	0.98	0.41
30～ (%)	4 (0.2)	71 (3.5)	493 (24.2)	822 (40.3)	511 (25.0)	117 (5.7)	20 (1.0)	3 (0.1)			2,041 (100.0)	101	2,142	0.91	0.19
40～ (%)	11 (0.2)	174 (3.1)	1,243 (22.2)	2,428 (43.3)	1,400 (25.0)	301 (5.4)	41 (0.7)	3 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	5,603 (100.0)	217	5,820	0.92	0.18
50～ (%)	6 (0.2)	91 (2.8)	799 (25.0)	1,461 (45.7)	691 (21.6)	133 (4.2)	12 (0.4)	2 (0.1)			3,195 (100.0)	130	3,325	0.89	0.17
60～ (%)	2 (0.2)	39 (3.7)	305 (29.0)	441 (42.0)	227 (21.6)	32 (3.0)	5 (0.5)				1,051 (100.0)	43	1,094	0.88	0.17
70～ (%)		14 (4.5)	90 (28.8)	142 (45.5)	55 (17.6)	10 (3.2)	1 (0.3)				312 (100.0)	6	318	0.87	0.17
80～ (%)		7 (5.8)	47 (38.8)	48 (39.7)	17 (14.0)	2 (1.7)					121 (100.0)	5	126	0.84	0.15
90～ (%)		3 (14.3)	5 (23.8)	8 (38.1)	5 (23.8)						21 (100.0)		21	0.86	0.18
100～ (%)			1 (33.3)	2 (66.7)							3 (100.0)		3	0.82	0.05
110～ (%)			1 (25.0)	3 (75.0)							4 (100.0)		4	0.79	0.11
120～ (%)															
合計 (%)	23 (0.2)	402 (3.2)	2,994 (24.1)	5,375 (43.3)	2,918 (23.5)	598 (4.8)	80 (0.6)	8 (0.1)	1 (0.0)	3 (0.0)	12,402 (100.0)	515	12,917	0.90	0.18
記載なし (%)												278	278		
総計 (%)	23 (0.2)	402 (3.2)	2,994 (24.1)	5,375 (43.3)	2,918 (23.5)	598 (4.8)	80 (0.6)	8 (0.1)	1 (0.0)	3 (0.0)	12,402 (100.0)	793	13,195	0.90	0.18
平均	46.58	49.34	49.58	48.96	47.93	46.67	45.72	42.65	46.10	28.23	48.74	47.28	48.68		
標準偏差	8.35	11.70	10.69	9.90	9.32	8.68	8.65	6.93		11.92	10.00	10.28	10.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査