

表 3143 nPCR(g/kg/day) %クレアチニン産生速度(%)別 (血液透析濾過患者 男性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	7 (0.7)	172 (17.2)	465 (46.4)	259 (25.8)	85 (8.5)	11 (1.1)	2 (0.2)	1 (0.1)			1,002 (100.0)		1,002	0.75	0.18
60～ (%)	2 (0.2)	98 (11.1)	399 (45.0)	295 (33.3)	80 (9.0)	11 (1.2)	1 (0.1)				886 (100.0)		886	0.78	0.16
70～ (%)		122 (7.8)	667 (42.5)	605 (38.5)	148 (9.4)	25 (1.6)	3 (0.2)	1 (0.1)			1,571 (100.0)		1,571	0.81	0.16
80～ (%)	2 (0.1)	115 (4.5)	935 (37.0)	1,093 (43.2)	335 (13.2)	44 (1.7)	5 (0.2)				2,529 (100.0)		2,529	0.84	0.16
90～ (%)	2 (0.1)	93 (2.9)	1,029 (32.1)	1,517 (47.3)	488 (15.2)	71 (2.2)	6 (0.2)	1 (0.0)		1 (0.0)	3,208 (100.0)		3,208	0.86	0.16
100～ (%)	1 (0.0)	58 (1.6)	964 (26.8)	1,779 (49.5)	681 (19.0)	99 (2.8)	10 (0.3)				3,592 (100.0)		3,592	0.88	0.15
110～ (%)	3 (0.1)	33 (1.0)	798 (23.8)	1,685 (50.3)	711 (21.2)	115 (3.4)	7 (0.2)				3,352 (100.0)		3,352	0.90	0.15
120～ (%)	1 (0.0)	21 (0.9)	442 (19.0)	1,213 (52.3)	531 (22.9)	106 (4.6)	7 (0.3)				2,321 (100.0)		2,321	0.92	0.15
130～ (%)		10 (0.8)	250 (19.8)	628 (49.7)	316 (25.0)	55 (4.4)	4 (0.3)				1,263 (100.0)		1,263	0.92	0.15
140～ (%)	2 (0.2)	5 (0.6)	128 (15.2)	431 (51.3)	237 (28.2)	32 (3.8)	3 (0.4)	2 (0.2)			840 (100.0)		840	0.94	0.15
合計 (%)	20 (0.1)	727 (3.5)	6,077 (29.6)	9,505 (46.2)	3,612 (17.6)	569 (2.8)	48 (0.2)	5 (0.0)		1 (0.0)	20,564 (100.0)		20,564	0.87	0.16
記載なし (%)		1 (16.7)	2 (33.3)		1 (16.7)					2 (33.3)	6 (100.0)	1,206	1,212	1.39	1.01
総計 (%)	20 (0.1)	728 (3.5)	6,079 (29.6)	9,505 (46.2)	3,613 (17.6)	569 (2.8)	48 (0.2)	5 (0.0)		3 (0.0)	20,570 (100.0)	1,206	21,776	0.87	0.16
平均	80.82	77.00	94.74	104.76	108.87	110.51	109.45	110.76		92.00	101.69		101.69		
標準偏差	44.90	25.61	23.83	21.89	22.03	22.40	39.58	57.13			23.86		23.86		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査