

表 3145 nPCR(g/kg/day) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前アルブミン濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)		1 (12.5)	5 (62.5)	1 (12.5)	1 (12.5)						8 (100.0)	2	10	0.74	0.22
1.5～ (%)	1 (2.5)	17 (42.5)	14 (35.0)	5 (12.5)	3 (7.5)						40 (100.0)	3	43	0.65	0.19
2.0～ (%)	9 (4.0)	61 (27.2)	87 (38.8)	51 (22.8)	14 (6.3)	1 (0.4)		1 (0.4)			224 (100.0)	15	239	0.70	0.19
2.5～ (%)	6 (0.5)	156 (14.0)	495 (44.3)	346 (30.9)	92 (8.2)	19 (1.7)	4 (0.4)				1,118 (100.0)	74	1,192	0.77	0.18
3.0～ (%)	11 (0.1)	404 (5.5)	2,390 (32.4)	3,194 (43.3)	1,155 (15.7)	194 (2.6)	23 (0.3)	4 (0.1)			7,375 (100.0)	339	7,714	0.85	0.17
3.5～ (%)	12 (0.1)	390 (2.2)	4,604 (26.4)	8,055 (46.1)	3,698 (21.2)	629 (3.6)	73 (0.4)	5 (0.0)		3 (0.0)	17,469 (100.0)	612	18,081	0.89	0.17
4.0～ (%)	3 (0.0)	81 (1.3)	1,316 (21.6)	2,938 (48.3)	1,419 (23.3)	294 (4.8)	27 (0.4)	2 (0.0)	1 (0.0)	3 (0.0)	6,084 (100.0)	199	6,283	0.92	0.17
4.5～ (%)		3 (1.1)	54 (20.3)	131 (49.2)	65 (24.4)	12 (4.5)	1 (0.4)				266 (100.0)	9	275	0.92	0.16
5.0～ (%)			2 (15.4)	5 (38.5)	5 (38.5)	1 (7.7)					13 (100.0)	2	15	0.98	0.14
合計 (%)	42 (0.1)	1,113 (3.4)	8,967 (27.5)	14,726 (45.2)	6,452 (19.8)	1,150 (3.5)	128 (0.4)	12 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	32,597 (100.0)	1,255	33,852	0.88	0.17
記載なし (%)	1 (0.3)	17 (4.5)	106 (28.3)	154 (41.1)	79 (21.1)	17 (4.5)		1 (0.3)			375 (100.0)	744	1,119	0.88	0.18
総計 (%)	43 (0.1)	1,130 (3.4)	9,073 (27.5)	14,880 (45.1)	6,531 (19.8)	1,167 (3.5)	128 (0.4)	13 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	32,972 (100.0)	1,999	34,971	0.88	0.17
平均	3.08	3.30	3.57	3.67	3.72	3.73	3.69	3.47	4.10	3.90	3.64	3.57	3.64		
標準偏差	0.68	0.52	0.40	0.35	0.34	0.34	0.33	0.46		0.20	0.38	0.43	0.38		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査