

表 3151 nPCR(g/kg/day) 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前ヘモグロビン濃度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)			8 (33.3)	11 (45.8)	5 (20.8)						24 (100.0)		24	0.84	0.13
5～ (%)		1 (4.0)	11 (44.0)	8 (32.0)	3 (12.0)	1 (4.0)		1 (4.0)			25 (100.0)	3	28	0.88	0.24
6～ (%)	1 (1.1)	7 (8.0)	36 (41.4)	27 (31.0)	13 (14.9)	3 (3.4)					87 (100.0)	7	94	0.81	0.19
7～ (%)	2 (0.6)	40 (11.8)	129 (38.1)	115 (33.9)	42 (12.4)	8 (2.4)	2 (0.6)	1 (0.3)			339 (100.0)	22	361	0.81	0.20
8～ (%)	5 (0.4)	85 (6.6)	425 (33.2)	518 (40.4)	215 (16.8)	31 (2.4)	3 (0.2)				1,282 (100.0)	81	1,363	0.84	0.17
9～ (%)	9 (0.2)	261 (5.4)	1,536 (31.7)	1,999 (41.2)	887 (18.3)	144 (3.0)	14 (0.3)	2 (0.0)			4,852 (100.0)	231	5,083	0.86	0.18
10～ (%)	12 (0.1)	337 (3.1)	3,011 (27.4)	5,032 (45.7)	2,146 (19.5)	409 (3.7)	46 (0.4)	4 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	10,999 (100.0)	390	11,389	0.88	0.17
11～ (%)	12 (0.1)	233 (2.4)	2,496 (25.2)	4,665 (47.1)	2,081 (21.0)	364 (3.7)	38 (0.4)	4 (0.0)		2 (0.0)	9,895 (100.0)	339	10,234	0.89	0.17
12～ (%)	2 (0.1)	104 (2.8)	911 (24.6)	1,732 (46.9)	773 (20.9)	150 (4.1)	20 (0.5)	1 (0.0)		3 (0.1)	3,696 (100.0)	141	3,837	0.90	0.17
13～ (%)		40 (3.9)	277 (26.9)	470 (45.6)	209 (20.3)	31 (3.0)	3 (0.3)				1,030 (100.0)	35	1,065	0.88	0.16
14～ (%)		11 (2.4)	155 (33.3)	194 (41.7)	88 (18.9)	15 (3.2)	2 (0.4)				465 (100.0)	13	478	0.87	0.16
合計 (%)	43 (0.1)	1,119 (3.4)	8,995 (27.5)	14,771 (45.2)	6,462 (19.8)	1,156 (3.5)	128 (0.4)	13 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	32,694 (100.0)	1,262	33,956	0.88	0.17
記載なし (%)		11 (4.0)	78 (28.1)	109 (39.2)	69 (24.8)	11 (4.0)					278 (100.0)	737	1,015	0.89	0.18
総計 (%)	43 (0.1)	1,130 (3.4)	9,073 (27.5)	14,880 (45.1)	6,531 (19.8)	1,167 (3.5)	128 (0.4)	13 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	32,972 (100.0)	1,999	34,971	0.88	0.17
平均	10.23	10.48	10.76	10.91	10.93	10.94	10.98	10.15	10.40	11.55	10.86	10.68	10.85		
標準偏差	1.41	1.42	1.33	1.21	1.21	1.18	1.21	1.90		0.62	1.25	1.32	1.26		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査