

表 3155 nPCR(g/kg/day) 透析前収縮期血圧(mmHg)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前収縮期血圧	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)				1 (100.0)							1 (100.0)		1	0.92	
60～ (%)		8 (7.7)	35 (33.7)	42 (40.4)	15 (14.4)	3 (2.9)	1 (1.0)				104 (100.0)	6	110	0.85	0.19
80～ (%)	1 (0.2)	36 (6.8)	162 (30.8)	220 (41.8)	88 (16.7)	17 (3.2)	2 (0.4)				526 (100.0)	35	561	0.85	0.18
100～ (%)	8 (0.3)	88 (3.7)	666 (28.2)	1,075 (45.6)	440 (18.7)	77 (3.3)	5 (0.2)				2,359 (100.0)	115	2,474	0.87	0.17
120～ (%)	7 (0.1)	204 (3.2)	1,730 (26.8)	2,916 (45.2)	1,318 (20.4)	243 (3.8)	29 (0.4)	4 (0.1)		1 (0.0)	6,452 (100.0)	223	6,675	0.89	0.17
140～ (%)	14 (0.1)	326 (3.4)	2,545 (26.2)	4,474 (46.0)	1,973 (20.3)	343 (3.5)	37 (0.4)	5 (0.1)		3 (0.0)	9,720 (100.0)	319	10,039	0.89	0.17
160～ (%)	5 (0.1)	235 (3.3)	1,992 (28.1)	3,229 (45.6)	1,339 (18.9)	247 (3.5)	32 (0.5)	2 (0.0)			7,081 (100.0)	208	7,289	0.88	0.17
180～ (%)	3 (0.1)	97 (3.6)	794 (29.7)	1,143 (42.8)	533 (20.0)	89 (3.3)	10 (0.4)	1 (0.0)		1 (0.0)	2,671 (100.0)	64	2,735	0.88	0.18
200～ (%)		24 (3.5)	211 (30.6)	304 (44.1)	121 (17.5)	24 (3.5)	5 (0.7)		1 (0.1)		690 (100.0)	16	706	0.88	0.17
220～ (%)		7 (3.9)	60 (33.7)	73 (41.0)	33 (18.5)	5 (2.8)					178 (100.0)	4	182	0.86	0.17
合計 (%)	38 (0.1)	1,025 (3.4)	8,195 (27.5)	13,477 (45.3)	5,860 (19.7)	1,048 (3.5)	121 (0.4)	12 (0.0)	1 (0.0)	5 (0.0)	29,782 (100.0)	990	30,772	0.88	0.17
記載なし (%)	5 (0.2)	105 (3.3)	878 (27.5)	1,403 (44.0)	671 (21.0)	119 (3.7)	7 (0.2)	1 (0.0)		1 (0.0)	3,190 (100.0)	1,009	4,199	0.88	0.17
総計 (%)	43 (0.1)	1,130 (3.4)	9,073 (27.5)	14,880 (45.1)	6,531 (19.8)	1,167 (3.5)	128 (0.4)	13 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	32,972 (100.0)	1,999	34,971	0.88	0.17
平均	142.24	149.37	151.09	150.56	150.65	150.12	152.31	149.00	205.00	153.40	150.66	145.70	150.50		
標準偏差	24.33	26.90	25.81	24.69	24.37	24.46	24.77	22.09		21.01	25.02	26.11	25.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査