

表 3156 nPCR(g/kg/day) 透析前拡張期血圧(mmHg)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

透析前拡張 期血圧	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			1 (20.0)	2 (40.0)	2 (40.0)						5 (100.0)	1	6	0.96	0.17
20～ (%)		9 (8.4)	38 (35.5)	44 (41.1)	12 (11.2)	4 (3.7)					107 (100.0)	4	111	0.83	0.18
40～ (%)	4 (0.2)	108 (4.9)	715 (32.1)	985 (44.3)	345 (15.5)	62 (2.8)	4 (0.2)	1 (0.0)			2,224 (100.0)	112	2,336	0.85	0.17
60～ (%)	21 (0.2)	487 (3.9)	3,479 (27.6)	5,722 (45.4)	2,386 (18.9)	438 (3.5)	54 (0.4)	6 (0.0)		1 (0.0)	12,594 (100.0)	467	13,061	0.88	0.17
80～ (%)	8 (0.1)	227 (2.9)	2,069 (26.8)	3,500 (45.4)	1,607 (20.8)	267 (3.5)	33 (0.4)	3 (0.0)		2 (0.0)	7,716 (100.0)	221	7,937	0.89	0.17
90～ (%)	4 (0.1)	127 (2.8)	1,203 (26.4)	2,040 (44.8)	982 (21.6)	174 (3.8)	15 (0.3)	2 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)	4,549 (100.0)	122	4,671	0.89	0.17
100～ (%)		62 (2.7)	612 (26.4)	1,068 (46.2)	466 (20.1)	91 (3.9)	14 (0.6)			1 (0.0)	2,314 (100.0)	60	2,374	0.89	0.17
120～ (%)		3 (2.0)	43 (29.3)	59 (40.1)	36 (24.5)	5 (3.4)	1 (0.7)				147 (100.0)	2	149	0.90	0.18
140～ (%)			2 (22.2)	4 (44.4)	2 (22.2)	1 (11.1)					9 (100.0)		9	0.94	0.14
合計 (%)	37 (0.1)	1,023 (3.4)	8,162 (27.5)	13,424 (45.3)	5,838 (19.7)	1,042 (3.5)	121 (0.4)	12 (0.0)	1 (0.0)	5 (0.0)	29,665 (100.0)	989	30,654	0.88	0.17
記載なし (%)	6 (0.2)	107 (3.2)	911 (27.5)	1,456 (44.0)	693 (21.0)	125 (3.8)	7 (0.2)	1 (0.0)		1 (0.0)	3,307 (100.0)	1,010	4,317	0.88	0.17
総計 (%)	43 (0.1)	1,130 (3.4)	9,073 (27.5)	14,880 (45.1)	6,531 (19.8)	1,167 (3.5)	128 (0.4)	13 (0.0)	1 (0.0)	6 (0.0)	32,972 (100.0)	1,999	34,971	0.88	0.17
平均	72.59	76.49	78.59	79.39	80.40	80.31	82.06	75.25	96.00	86.40	79.31	76.03	79.20		
標準偏差	12.33	15.02	15.00	14.57	14.29	14.52	14.54	11.86		9.61	14.67	15.25	14.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査